






**سلسلة تمارين الكيمياء  
السنة الثانية بكالوريا 2007-2008  
التحولات السريعة والتحولات البطيئة  
العوامل الحركية**

**تمرين 1**

أكتب نصف معادلة الأكسدة - اختزال المقرونة بكل مزدوجة من المزدوجات التالية ، مع تحديد النوع المؤكسد والنوع المختزل .

**تمرين 2**

ندخل قطعة صغيرة من ورق الألومنيوم  $\text{Al}_{(\text{s})}$  في ثنائي البروم  $\text{Br}_{2(\ell)}$  السائل ، فيحدث تفاعل ينتج عنه برومور الألومنيوم المكون من الأيونات  $\text{Br}^-_{(\text{aq})}$  و  $\text{Al}^{3+}_{(\text{aq})}$  .

- 1 - ما هي المزدوجتان مختزل / مؤكسد المتدخلتان في هذا التفاعل ؟
- 2 - أكتب المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل .

3 - أحسب الكتلة القصوى للألومنيوم التي تتفاعل مع  $2\text{ml}$  من ثنائي البروم .  
نعطي كثافة ثنائي البروم  $1\text{d}=3,1$  و  $\text{M}(\text{Br})=80\text{g/mol}$  و  $\text{M}(\text{Al})=27\text{g/mol}$  .

**تمرين 3**

لدراسة بعض العوامل الحركية المؤثرة على تفاعل فوق أوكسيد الهيدروجين أو الماء الأوكسيجيني مع أيونات اليودور في وسط حمضي نجذب ثلات تجارب حسب الظروف البدئية التالية :

التجربة (1) : درجة الحرارة  $25^\circ\text{C}$  و  $[I_2] = 0,05\text{ mol / l}$  و  $[\text{H}_2\text{O}_2] = 0,05\text{ mol / l}$

التجربة 2 : درجة الحرارة  $25^\circ\text{C}$  و  $[I_2] = 0,10\text{ mol / l}$  و  $[\text{H}_2\text{O}_2] = 0,10\text{ mol / l}$

التجربة (3) : درجة الحرارة  $50^\circ\text{C}$  و  $[I_2] = 0,10\text{ mol / l}$  و  $[\text{H}_2\text{O}_2] = 0,10\text{ mol / l}$

يبين الشكل أسفله منحنى تطور تركيز ثنائي اليود  $I_2$  المتكون بدلاة الزمن بالنسبة لكل تجربة

- 1 - أكتب معادلة تفاعل الأكسدة - اختزال بين المزدوجتين



- 2 - عين المنحنى الموافق لكل تجربة . علل أجوبتك .

**تمرين 4**

للماء الأوكسيجيني أو فوق أوكسيد الهيدروجين  $(\text{H}_2\text{O}_2)$  خاصيات مؤكسد - مختزل في آن واحد ، فهو يتفكك حسب تفاعل أكسدة - اختزال ذاتي . dismutation


المزدوجتان المتفاعلتان هما  $\text{O}_{2(g)} / \text{H}_2\text{O}_{2(\text{aq})}$  و  $\text{H}_2\text{O}_{2(\text{aq})} / \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$

- 1 - أكتب معادلة تفاعل أكسدة - اختزال الحاصل أثناء تفكك الماء الأوكسيجيني .

- 2 - لماذا يسمى بتفاعل أكسدة - اختزال ذاتي ؟

3

المنزلية ؟

**\* تمرين 5**

نريد تحديد النسبة الكتليلية لأوكسيد القصدير  $\text{SnO}_2(s)$  في معدن ما للقصدير .

- 1 – نأخذ عينة كتلتها  $m=0,44\text{g}$  من هذا المعدن ، بعد سحقه ومعالجته في وسط حمضي وساخن بواسطة مسحوق الرصاص  $(\text{Pb})_{(s)}$  بوفرة ، فنحصل على محلول  $\text{S}$  يتكون أساساً من أيونات القصدير  $\text{II}^{+}$  وأيونات الرصاص  $\text{II}^{-}$  .

1 – 1

2 – 1

المعادلة الكيميائية الحصيلة . ما هو الدور الذي يلعبه الرصاص ؟ ( مؤكسد أم مختزل )

- 2 – نعتبر أن الرصاص لا يتفاعل إلا مع أوكسيد القصدير  $\text{II}$  المتواجد في العينة . عند نهاية التفاعل نقوم بعزل الجسم الصلب النتبقي وبعد تنظيفه نضيفه إلى محلول  $\text{S}$  .

نعاير محلول  $\text{S}$  المحصل عليه بواسطة محلول ثنائي كرومات البوتاسيوم  $(2\text{K}^{+}_{(aq)} + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}_{(aq)})$  تركيزه

$$\text{C} = 0,020\text{ mol/l}$$

- 2 – 1 ما هو الجسم الصلب المتبقى والذي تمت إضافته إلى محلول  $\text{S}$  ؟ لماذا ؟

$$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}_{(aq)} / \text{Cr}^{3+}_{(aq)}$$

- 2 – 2 أثبت نصف المعادلة أكسدة – اختزال للمزدوجة .
- 2 – 3 استنتج المعادلة الكيميائية الحصيلة للتفاعل خلال معايرة محلول  $\text{S}$  بواسطة محلول ثنائي كرومات البوتاسيوم .

3 – نحصل على التكافؤ ، عندما تتم إضافة حجم  $V_E = 21,7\text{cm}^3$  من محلول ثنائي كرومات البوتاسيوم .

$$\text{C} \cdot V_E = \frac{n_i(\text{Si}^{2+})}{3}$$

$n_i(\text{Si}^{2+})$  كمية المادة البديلة لأيونات القصدير  $\text{II}^{-}$  .

- 3 – 2 استنتاج النسبة الكتليلية لأوكسيد القصدير  $\text{II}$  في المعدن المدروس .

$$\text{M}(\text{Sn}) = 118,7\text{g/mol}$$

### تمرين 6 \*

نعتبر الأكسدة البطيئة لحمض الأوكساليك  $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4(aq)$  بواسطة أيونات البرمنغنات  $(\text{MnO}_4)_{(aq)}$  .

عند اللحظة  $t=0$  ، نمزج  $V_0 = 25\text{mL}$  من محلول برمغنات البوتاسيوم تركيزه

$$\text{C}_0 = 1,0 \cdot 10^{-2}\text{ mol/l}$$

وحجم  $V = 20\text{mL}$  من حمض الأوكساليك تركيزه

$$\text{C}_r = 1,0 \cdot 10^{-1}\text{ mol/l}$$

ونصف من حمض الكبريتيك لجعل الوسط التفاعلي حمضي .

1

واستنتاج المعادلة الكيميائية الحصيلة .

- 2 – أذكر النوع الكيميائي المؤكسد والنوع الكيميائي المختزل خلال هذا التحول .

3 – أحسب كمية المادة البديلة للمتفاعلات المتداخلة في هذا التفاعل .

4 – حدد المتفاعل المهد .

- 5 – أوجد الحصيلة النهائية إذا اعتبرنا أن هذا التفاعل تام . واستنتاج تركيز أيونات المنغنيز عند نهاية التفاعل .

6

يتم إبراز تطور هذا التحول الكيميائي .