

Exercice

(Noté sur 04 points sur 20)

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$; on note v l'endomorphisme de \mathbb{R}^3 canoniquement associé à A .

1.1. Calculer le polynôme caractéristique χ_A de la matrice A et en déduire que A possède une seule valeur propre λ à préciser.

$$\boxed{\chi_A(x) = \det(xI_3 - A)}$$
$$= \begin{vmatrix} x-3 & -1 & 1 \\ -1 & x-1 & -1 \\ -2 & 0 & x-2 \end{vmatrix}$$

(Sarrus)

$$\begin{aligned} &= (x-3)(x-2)(x-2) - 2 + 2(x-1) - (x-2) \\ &= (x-3)(x-1)(x-2) + (x-2) \quad \left(\begin{array}{l} 2 \text{ racine} \\ \text{évidente} \end{array} \right) \\ &= (x-2)((x-3)(x-2) + 1) \\ &= (x-2)(x^2 - 4x + 1) \\ &= \boxed{(x-2)^3} \end{aligned}$$

$\rightarrow Sp(A) = \{2\}$; 2 l'unique racine de $\chi_A(x)$

1.2. Déterminer $\text{Ker}(v - \lambda \text{id}_{\mathbb{R}^3})$, le sous-espace propre de v associé à son unique valeur propre λ .

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On a:

$$(x, y, z) \in \text{Ker}(v - 2 \text{id}_{\mathbb{R}^3}) \Leftrightarrow (v - 2 \text{id}_{\mathbb{R}^3})(x, y, z) = (0, 0, 0)$$

$$\Leftrightarrow (A - 2I_3) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y + z = 0 \\ 2x = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y + z = 0 \\ 2x = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = z \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow (x, y, z) = (0, z, z)$$

$$\Leftrightarrow (x, y, z) = z(0, 1, 1)$$

$$\Leftrightarrow (x, y, z) \in \text{Vect}((0, 1, 1))$$

$\% :$ $\ker(v - 2 \text{id}_{\mathbb{R}^3}) = \text{Vect}((0, 1, 1))$

1.3. La matrice A est-elle diagonalisable dans $M_3(\mathbb{R})$? Est-elle trigonalisable dans $M_3(\mathbb{R})$?

(i) A n'est pas diagonalisable dans $M_3(\mathbb{R})$

Car $\dim(E_2(v)) = 1$ différent de la multiplicité de la valeur propre 2 qui est 3.

Ainsi v , puis A , n'est pas diagonalisable dans $M_3(\mathbb{R})$.

(ii) A est trigonalisable dans $M_3(\mathbb{R})$

Car $\chi_A(x) = (x-2)^3$ scinde dans \mathbb{R}

1.4. On considère l'endomorphisme $u = v - 2 \text{id}_{\mathbb{R}^3}$ et on pose $e_1 = (1, 0, 0)$.

1.4.1. Montrer que l'endomorphisme u est nilpotent.

Oua $\chi_v(v) = 0$ d'après Cayley-Hamilton

$$\text{Donc } (v - 2 \text{id}_{\mathbb{R}^3})^3 = 0$$

$$\Rightarrow u^3 = 0$$

Abs u est nilpotent

1.4.2. Déterminer le noyau de l'endomorphisme u^2 puis vérifier que $e_1 \notin \text{Ker } u^2$.

i) On veut $\text{ker}(u^2)$.

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} (x, y, z) \in \text{ker}(u^2) &\Leftrightarrow u^2(x, y, z) = (0, 0, 0) \\ &\Leftrightarrow (\varphi - 2\text{id}_{\mathbb{R}^3})^2(x, y, z) = (0, 0, 0) \\ &\Leftrightarrow (A - 2I_3)^2 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow 2x + 2y - 2z = 0 \\ &\Leftrightarrow x + y - z = 0 \\ &\Leftrightarrow x = -y + z \\ &\Leftrightarrow (x, y, z) = (-y + z, y, z) \\ &\Leftrightarrow (x, y, z) = y(-1, 1, 0) + z(1, 0, 1) \\ &\Leftrightarrow (x, y, z) \in \text{Vect}((-1, 1, 0); (1, 0, 1)) \end{aligned}$$

$$\mathcal{C} \circ \text{ker}(u^2) = \text{vect}((-1, 1, 0), (1, 0, 1))$$

ii) $e_1 \notin \ker(u^2)$; En effet

Il s'agit de vérifier que $u^2(e_1) \neq 0$

$$\text{Càd que } (A - 2I_3)^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Et on a :

$$(A - 2I_3)^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

RR : On vient de voir que :

$$(x, y, z) \in \ker(u^2) \Leftrightarrow x + y - z = 0$$

$$\text{Donc } e_1 = (1, 0, 0) \notin \ker(u^2) \text{ car } 1 + 0 - 0 \neq 0$$

1.4.3. Montrer que la famille $\mathcal{B} = (u^2(e_1), u(e_1), e_1)$ est une base de \mathbb{R}^3 et écrire la matrice T de v dans la base \mathcal{B} , puis exprimer la matrice A en fonction de T .

i) \forall que \mathcal{B} est une base de \mathbb{R}^3 .

$\text{Card}(\mathcal{B}) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$, il suffit de montrer qu'elle est libre.

Soient $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha u^2(e_1) + \beta u(e_1) + \gamma e_1 = 0$ (R)

\forall que $\alpha = \beta = \gamma = 0$.

Composons dans (R) par u^2 .

On aura $\gamma u^2(e_1) = 0$; car $u^3 = u^4 = 0$

$$\Rightarrow \boxed{\gamma = 0}, \text{ car } u^2(e_1) \neq 0$$

$$\textcircled{R} \text{ devient } \alpha u^2(e_1) + \beta u(e_1) = 0$$

Composons par u , on aura $\beta u^2(e_1) = 0$

$$\Rightarrow \boxed{\beta = 0}, \text{ car } u^2(e_1) \neq 0$$

$$\textcircled{R} \text{ devient } \alpha u^2(e_1) = 0$$

Alors $\boxed{\alpha = 0}$, car $u^2(e_1) \neq 0$

Enfin $\boxed{\alpha = \beta = \gamma = 0}$

$$\text{ii) } \text{mat}_B(\vartheta) = T = ?$$

$$\vartheta = u + 2\text{id}_{\mathbb{R}^3}$$

$$\vartheta(e_1) = u(e_1) + 2e_1$$

$$\vartheta(u(e_1)) = u^2(e_1) + 2u(e_1)$$

$$\vartheta(u^2(e_1)) = \underbrace{u^3(e_1)}_{=0} + 2u^2(e_1) = 2u^2(e_1)$$

$$\text{2) i) } T = \text{mat}_B(\vartheta) = \begin{matrix} & \vartheta(u^2(e_1)) & \vartheta(u(e_1)) & \vartheta(e_1) \\ \begin{matrix} u^2(e_1) \\ u(e_1) \\ e_1 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$\text{iii) } \text{mat}_{B_c}(\vartheta) = A \quad ; \quad \text{mat}_B(\vartheta) = T$$

$$\text{On a } \text{mat}_{B_c}(\vartheta) = P \text{mat}_B(\vartheta) P^{-1}$$

où $P = P_{B_c, B}$ la matrice de passage de B_c à B .

$$\Rightarrow A = P T P^{-1}$$

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow u(e_1) = (1, 1, 2)$$

$$(A - 2I_3)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow u^2(e_1) = (0, 2, 2)$$

$$\text{Ainsi } P = \text{mat}_{B_c}(B) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

1.4.4. Calculer l'exponentielle de la matrice A . On rappelle que $\exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} A^k$.

$$A = P T P^{-1} \Rightarrow \underline{\exp(A) = P \exp(T) P^{-1}}$$

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = N + 2I_3$$

$$\text{où } N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\exp(T) = \exp(N + 2I_3)$$

$$= \exp(N) \cdot \exp(2I_3) \quad \left(\begin{array}{l} \text{car } N \text{ et } (2I_3) \\ \text{commutent} \end{array} \right)$$

$$\exp(2I_3) = \begin{pmatrix} e^2 & & \\ & e^2 & \\ & & e^2 \end{pmatrix} = e^2 I_3$$

$$\Leftarrow \exp \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\lambda_n} \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\exp(N) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} N^k$$

$$\text{On a } N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; N^3 = 0$$

$$\Rightarrow \exp(N) = \sum_{k=0}^2 \frac{1}{k!} N^k \quad (\forall k \geq 3, N^k = 0)$$

$$\exp(N) = I_3 + N + \frac{1}{2} N^2$$

$$\Rightarrow \exp(T) = e^2 \left(I_3 + N + \frac{1}{2} N^2 \right)$$

$$\exp(T) = e^2 \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Avec } (\exp(A) = P \exp(T) P^{-1})$$

$$\text{et } P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

on a :

$$\exp(A) = \frac{e^2}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{e^2}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\exp(A) = \frac{e^2}{2} \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 4 & 2 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

c/c: $\exp(A) = e^2 \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Méthode 2 (Plus rapide)

Posons $B = A - 2I_3$, qua $B^3 = 0$
 $\Rightarrow \exp(B) \stackrel{\text{facile}}{=} I_3 + B + \frac{1}{2}B^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Car $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$; $\frac{B^2}{2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

et qua :

$\exp(A) = \exp(B + 2I_3)$
 $= \exp(B) \cdot \exp(2I_3)$ (car B et $2I_3$ commutent)
 $= \exp(B) \cdot e^2 \cdot I_3$

$= e^2 \cdot \exp(B)$

$= e^2 \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Fin

CNC - 2019 - MP - Math 2

Problème

2.1

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \dots & \frac{1}{a_1+b_n} \\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & \dots & \frac{1}{a_2+b_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{1}{a_n+b_2} & \frac{1}{a_n+b_2} & \dots & \frac{1}{a_n+b_n} \end{vmatrix}$$

On a $a_{i_1} = a_{i_2}$ et $i_1 \neq i_2$

Alors les deux lignes L_{i_1} et L_{i_2} sont égales

D'où $\Delta_n = 0$

2.2 $\left(\prod_{1 \leq j \leq n-1} (x-b_j) \right) \wedge \left(\prod_{1 \leq k \leq n} (x+a_k) \right) = 1$?

$(\forall 1 \leq j \leq n-1, \forall 1 \leq k \leq n, b_j \neq -a_k)$ (car $b_j + a_k \neq 0$)

$\Rightarrow (\forall 1 \leq j \leq n-1, \forall 1 \leq k \leq n, (x-b_j) \wedge (x+a_k) = 1)$

D'où $\left(\prod_{1 \leq j \leq n-1} (x-b_j) \right) \wedge \left(\prod_{1 \leq k \leq n} (x+a_k) \right) = 1$

Propriété 2

Les polynômes $\left(\prod_{1 \leq j \leq n-1} (x-b_j) \right)$ et $\left(\prod_{1 \leq k \leq n} (x+a_k) \right)$ sont scindés et n'ont aucune racine commune.
Donc ils sont premiers entre eux.

$$\textcircled{2.3.1} \quad R(x) = \frac{\prod_{1 \leq j \leq n-1} (x - b_j)}{\prod_{1 \leq k \leq n} (x + a_k)} .$$

Pour tout $1 \leq k \leq n$, $(-a_k)$ est une racine de $\prod_{1 \leq k \leq n} (x + a_k)$

et n'en est pas pour $\prod_{1 \leq j \leq n-1} (x - b_j)$.

D'où les pôles de $R(x)$ sont les $(-a_k)$, pour tout $1 \leq k \leq n$.

En plus, ils sont tous simples car tous racines simples de $\prod_{1 \leq k \leq n} (x + a_k)$.

$\textcircled{2.3.2}$

$$R(x) = \frac{\prod_{1 \leq j \leq n-1} (x - b_j)}{\prod_{1 \leq j \leq n} (x + a_j)} \in \mathbb{R}(x) \text{ et } d^{\circ}(R) = -1 < 0$$

en plus tous ses pôles, $(-a_j)_{1 \leq j \leq n}$, sont simples

Alors la décomposition en éléments simples est de la forme :

$$R(x) = \sum_{k=1}^n \frac{d_k}{x + a_k} \quad \textcircled{\Omega}$$

$$R(x) = \frac{\prod_{1 \leq j \leq n-1} (x - b_j)}{\prod_{1 \leq j \leq n} (x + a_j)} = \sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k}{x + a_k}$$

(12)

Soit $1 \leq k \leq n$, $\alpha_k = ?$

Multiplicons dans (12) par $(x + a_k)$, puis faisons tendre x vers $(-a_k)$, on obtient :

$$\alpha_k = \frac{\prod_{1 \leq j \leq n-1} (-a_k - b_j)}{\prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq k}} (-a_k + a_j)} = \frac{(-1)^{n-1} \prod_{j=1}^{n-1} (a_k + b_j)}{(-1)^{n-1} \prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq k}} (a_k - a_j)}$$

c/c :

$$\forall 1 \leq k \leq n, \alpha_k = \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (a_k + b_j)}{\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n (a_k - a_j)}$$

2.4.1

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \dots & \frac{1}{a_2+b_n} \\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & \dots & \frac{1}{a_2+b_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{1}{a_n+b_1} & \frac{1}{a_n+b_2} & \dots & \frac{1}{a_n+b_n} \end{vmatrix}$$

Notons L'_1, \dots, L'_n ses lignes.

$$\text{Notons } \Delta = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \dots & \frac{1}{a_2+b_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{1}{a_{n-1}+b_1} & \frac{1}{a_{n-1}+b_2} & \dots & \frac{1}{a_{n-1}+b_n} \\ R(b_2) & R(b_2) & \dots & R(b_n) \end{vmatrix}$$

La dernière ligne est :

$$\left(\left[\frac{\alpha_1}{a_1+b_2} + \dots + \frac{\alpha_n}{a_n+b_2} \right] \dots \left[\frac{\alpha_1}{a_1+b_n} + \dots + \frac{\alpha_n}{a_n+b_n} \right] \right)$$

$$= \alpha_1 \underbrace{\left(\frac{1}{a_1+b_2} \dots \frac{1}{a_1+b_n} \right)}_{L'_1} + \dots + \alpha_n \underbrace{\left(\frac{1}{a_n+b_2} \dots \frac{1}{a_n+b_n} \right)}_{L'_n}$$

$$= \alpha_1 L'_1 + \dots + \alpha_{n-1} L'_{n-1} + \alpha_n L'_n$$

Avec $L_n \leftarrow L_n - (\alpha_1 L_1 + \dots + \alpha_{n-1} L_{n-1})$ dans

le déterminant Δ on obtient :

$$\Delta = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \dots & \frac{1}{a_1+b_n} \\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & \dots & \frac{1}{a_2+b_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{d_n}{a_n+b_1} & \frac{d_n}{a_n+b_2} & \dots & \frac{d_n}{a_n+b_n} \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \Delta = d_n \begin{vmatrix} \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \dots & \frac{1}{a_1+b_n} \\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & \dots & \frac{1}{a_2+b_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{1}{a_n+b_1} & \frac{1}{a_n+b_2} & \dots & \frac{1}{a_n+b_n} \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta = d_n \Delta_n} \quad \text{CQFD}$$

2.4.2

$$\text{On a } d_n \Delta_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \dots & \frac{1}{a_1+b_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{1}{a_{n-1}+b_1} & \frac{1}{a_{n-1}+b_2} & \dots & \frac{1}{a_{n-1}+b_n} \\ R(b_2) & R(b_2) & \dots & R(b_n) \end{vmatrix}$$

$$\text{or } R(b_1) = \dots = R(b_{n-1}) = 0$$

$$\text{Ainsi } d_n \Delta_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \dots & \frac{1}{a_1+b_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{1}{a_{n-1}+b_1} & \frac{1}{a_{n-1}+b_2} & \dots & \frac{1}{a_{n-1}+b_n} \\ 0 & 0 & \dots & 0 \quad R(b_n) \end{vmatrix}$$

En développant suivant la dernière ligne, on a :

$$d_n \Delta_n = R(b_n) \Delta_{n-1}$$

2.4.3

(i) $\Delta_2 =$

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} \\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{(a_1+b_1)(a_2+b_2)} - \frac{1}{(a_2+b_1)(a_1+b_2)}$$

$$= \frac{(a_2+b_1)(a_1+b_2) - (a_2+b_2)(a_1+b_1)}{(a_1+b_1)(a_2+b_2)(a_2+b_1)(a_1+b_2)}$$

$$\Delta_2 = \frac{a_2 b_2 + a_1 b_1 - a_2 b_1 - a_1 b_2}{(a_1 + b_1)(a_2 + b_2)(a_2 + b_1)(a_1 + b_2)}$$

(ii) M que :

$$\forall n \geq 2, \Delta_n = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{1 \leq i, j \leq n} (a_i + b_j)}$$

Raisonnons par récurrence sur $n \geq 2$.

Initialisation : Pour $n = 2$

$$\begin{aligned} \Delta_2 &= \frac{(a_2 - a_1)b_2 + (a_1 - a_2)b_1}{(a_1 + b_1)(a_2 + b_2)(a_2 + b_1)(a_1 + b_2)} \\ &= \frac{(a_2 - a_1)(b_2 - b_1)}{(a_1 + b_1)(a_2 + b_2)(a_2 + b_1)(a_1 + b_2)} \\ &= \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq 2} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{1 \leq i, j \leq 2} (a_i + b_j)} \end{aligned}$$

Hérédité :

Soit $n \geq 2$.

Supposons que

$$\Delta_{n-1} = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n-1} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{1 \leq i, j \leq n-1} (a_i + b_j)}$$

Et montrons que

$$\Delta_n = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{1 \leq i, j \leq n} (a_i + b_j)}$$

On a :

$$\Delta_n = \frac{R(b_n)}{d_n} \Delta_{n-1}$$

$$= \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (b_n - b_j)}{\prod_{k=1}^n (b_n + a_k)} \cdot \frac{\prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq n}} (a_n - a_j)}{\prod_{j=1}^{n-1} (a_n + b_j)} \cdot \Delta_{n-1}$$

H.R.


$$= \frac{\left(\prod_{j=2}^{n-1} (b_n - b_j)(a_n - a_j) \right)}{\prod_{k=1}^n (b_n + a_k) \cdot \prod_{k=1}^{n-1} (a_n + b_k)}$$

$$\frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n-1} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{1 \leq i < j \leq n-1} (a_i + b_j)}$$

Saviez-vous?

$\left(\prod_{2 \leq i < j \leq n-1} x_{ij} \right) \cdot \boxed{?} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} x_{ij}$
 Réponse
 $\left(\prod_{i=2}^{n-1} x_{in} \right)$
NB

$\left(\prod_{1 \leq i, j \leq n-1} x_{ij} \right) \cdot \boxed{?} = \prod_{1 \leq i, j \leq n} x_{ij}$
 Réponse
 $\left(\prod_{i=1}^n x_{in} \right) \times \left(\prod_{i=1}^{n-1} x_{ni} \right)$
NB



$$\Delta_n = \frac{\left(\prod_{j=2}^{n-1} (b_n - b_j)(a_n - a_j) \right) \cdot \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n-1} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{1 \leq i < j \leq n-1} (a_i + b_j)}}{\prod_{k=1}^n (a_k + b_n) \cdot \prod_{k=1}^{n-1} (a_n + b_k)}$$

$$\Delta_n = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_i + b_j)}$$

CQFD

Fin partie I

2^{ème} partie

3.2 (i)

$$|G(u_1, u_2)| = \begin{vmatrix} (u_1 | u_1) & (u_1 | u_2) \\ (u_2 | u_1) & (u_2 | u_2) \end{vmatrix}$$

$$= (u_1 | u_1)(u_2 | u_2) - (u_1 | u_2)^2 \geq 0$$

d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz

$$(ii) |G(u_1, u_2)| = 0 \Leftrightarrow (u_1 | u_2)^2 = (u_1 | u_1)(u_2 | u_2)$$

$$\Leftrightarrow (u_1 | u_2) \text{ est lié}$$

C'est le cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

3.2

$$\text{On a } G(u_1, \dots, u_p) = (u_i | u_j)_{1 \leq i, j \leq p}$$

$$\text{et que : } (\forall 1 \leq i, j \leq p, (u_i | u_j) = (u_j | u_i))$$

D'où la matrice $G(u_1, \dots, u_p)$ est symétrique

3.3.1

$$|G(w_1, \dots, w_p)| = \begin{vmatrix} (w_1 | w_1) & \dots & (w_1 | w_i) & \dots & (w_1 | w_p) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (w_i | w_1) & \dots & (w_i | w_i) & \dots & (w_i | w_p) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (w_p | w_1) & \dots & (w_p | w_i) & \dots & (w_p | w_p) \end{vmatrix}$$

soit $(\forall k \neq i, w_k = u_k)$, alors :

$$|G(w_1, \dots, w_p)| = \begin{vmatrix} (u_1 | u_1) & \dots & (u_1 | w_i) & \dots & (u_1 | u_p) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (w_i | u_1) & \dots & (w_i | w_i) & \dots & (w_i | u_p) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (u_p | u_1) & \dots & (u_p | w_i) & \dots & (u_p | u_p) \end{vmatrix}$$

On a : $w_i = u_i + \sum_{j \neq i} \lambda_j u_j$

$$\Rightarrow \begin{cases} (w_i | u_1) = (u_i | u_1) + \sum_{j \neq i} \lambda_j (u_j | u_1) \\ \dots \\ (w_i | u_p) = (u_i | u_p) + \sum_{j \neq i} \lambda_j (u_j | u_p) \end{cases}$$

La i ème ligne de $|G(w_1, \dots, w_p)|$ est alors :

$$\left((u_i | u_1) \dots (u_i | u_p) \right) + \left(\sum_{j \neq i} \lambda_j (u_j | u_1) \dots \sum_{j \neq i} \lambda_j (u_j | u_p) \right)$$

Càd : $\left((u_i | u_1) \dots (u_i | u_p) \right) + \sum_{j \neq i} \lambda_j \underbrace{\left((u_j | u_1) \dots (u_j | u_p) \right)}_{= L_j, \text{ la } j^{\text{ème}} \text{ ligne}}$

Alors avec $L_i \leftarrow L_i - \sum_{j \neq i} \lambda_j L_j$, on aura :

$$|G(w_1, \dots, w_p)| = \begin{vmatrix} (u_1 | u_1) & \dots & (u_1 | w_i) & \dots & (u_1 | u_p) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (u_i | u_1) & \dots & (u_i | w_i) & \dots & (u_i | u_p) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (u_p | u_1) & \dots & (u_p | w_i) & \dots & (u_p | u_p) \end{vmatrix}$$

On fait de même pour la i ème colonne :

$$\text{On a : } w_i = v_i + \sum_{j \neq i} \lambda_j v_j$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (v_1 | w_i) = (v_1 | v_i) + \sum_{j \neq i} \lambda_j (v_1 | v_j) \\ \vdots \\ (v_p | w_i) = (v_p | v_i) + \sum_{j \neq i} \lambda_j (v_p | v_j) \end{cases}$$

La i ème colonne de $|G(w_1, \dots, w_p)|$ est alors :

$$\begin{pmatrix} (v_1 | v_i) \\ \vdots \\ (v_p | v_i) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sum_{j \neq i} \lambda_j (v_1 | v_j) \\ \vdots \\ \sum_{j \neq i} \lambda_j (v_p | v_j) \end{pmatrix}$$

$$\text{C'est } \begin{pmatrix} (v_1 | v_i) \\ \vdots \\ (v_p | v_i) \end{pmatrix} + \sum_{j \neq i} \lambda_j \underbrace{\begin{pmatrix} (v_1 | v_j) \\ \vdots \\ (v_p | v_j) \end{pmatrix}}_{= C_j \text{ la } j\text{ème colonne}}$$

Alors avec $C_i \leftarrow C_i - \sum_{j \neq i} \lambda_j C_j$, on aura :

$$|G(w_1, \dots, w_p)| = \begin{vmatrix} (v_1 | v_1) & \dots & (v_1 | v_i) & \dots & (v_1 | v_p) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (v_i | v_1) & \dots & (v_i | v_i) & \dots & (v_i | v_p) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (v_p | v_1) & \dots & (v_p | v_i) & \dots & (v_p | v_p) \end{vmatrix} \\ = |G(v_1, \dots, v_p)| \quad \text{CQFD}$$

3.3.2 Supposons que (v_1, \dots, v_p) est liée.

Alors il existe $(d_1, \dots, d_p) \in \mathbb{R}^p$ tel que :

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^p d_j v_j = 0 \\ \exists i \in \{1, \dots, p\}, d_i \neq 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow d_i v_i + \sum_{j \neq i} d_j v_j = 0$$

$$\Rightarrow v_i + \sum_{j \neq i} \frac{d_j}{d_i} v_j = 0$$

Notons pour tout $j \neq i$, $\lambda_j = \frac{d_j}{d_i}$.

On a alors $v_i + \sum_{j \neq i} \lambda_j v_j = 0$

Posons $\begin{cases} w_k = v_k, \text{ pour tout } k \neq i \\ w_i = v_i + \sum_{j \neq i} \lambda_j v_j \end{cases}$

D'après **3.3.1** on a : $|G(w_1, \dots, w_p)| = |G(v_1, \dots, v_p)|$

Or $w_i = 0$ alors $|G(w_1, \dots, w_p)| = 0$, car $L_i = 0$

D'où $|G(v_1, \dots, v_p)| = 0$ CQFD

3.4.1

$$\text{On a } \begin{cases} v_j = \sum_{k=1}^p b_{k,j} e_k \\ v_i = \sum_{k=1}^p b_{k,i} e_k \end{cases}$$

et (e_1, \dots, e_p) base orthonormée de $\text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$

Alors $(v_i | v_j) = \sum_{k=1}^p b_{k,i} b_{k,j}$

3.4.2 Soit $(i, j) \in \{1, \dots, p\}^2$.

Il s'agit de montrer que $(v_i | v_j) = ({}^t B \cdot B)_{ij}$

On a $({}^t B \cdot B)_{ij} = \sum_{k=1}^p ({}^t B)_{ik} (B)_{kj}$

$$= \sum_{k=1}^p B_{ki} B_{kj}$$

$$= \sum_{k=1}^p b_{ki} b_{kj}$$

$$\| B_{ij} = b_{ij}$$

$$= (v_i | v_j) \quad (\text{d'après } 3.4.1)$$

3.4.3 $|\mathcal{G}(v_1, \dots, v_p)| = \det({}^t B \cdot B)$

$$= \det({}^t B) \det(B)$$

$$= \det(B)^2$$

$$= (\det(B)) \geq 0$$

Reste à justifier que $\det(B) \neq 0$.

On a $B = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{p1} & \dots & b_{pp} \end{pmatrix}$; avec $\begin{cases} v_j = \sum_{k=1}^p b_{k,j} e_k \\ \forall j \in \{1, \dots, p\} \end{cases}$

Cad $B = \text{mat}(v_1, \dots, v_p)$ qui est invertible
 (e_1, \dots, e_p)

en tant que matrice d'une base dans une base
 (ou matrice de passage d'une base à une base)

D'où $\det(B) \neq 0$

3.5.1 $x = \underbrace{(x - P_F(x))}_{\in F^\perp} + P_F(x)$ et $(x - P_F(x)) \in F^\perp$

$$G(v_1, \dots, v_n, x) = \begin{vmatrix} (v_1|v_1) & \dots & (v_1|v_n) & (v_1|x) \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ (v_n|v_1) & \dots & (v_n|v_n) & (v_n|x) \\ (x|v_1) & \dots & (x|v_n) & (x|x) \end{vmatrix}$$

Pour tout $1 \leq i \leq p$, on a :

$$(v_i|x) = \underbrace{(v_i|(x - P_F(x)))}_{=0} + (v_i|P_F(x)) = (v_i|P_F(x))$$

$$(x|v_i) = (P_F(x)|v_i)$$

$$\text{Et } (x|x) = \|P_F(x) + (x - P_F(x))\|^2 = \|P_F(x)\|^2 + \|x - P_F(x)\|^2$$

$$G(v_1, \dots, v_n, x) = \begin{vmatrix} (v_1|v_1) & \dots & (v_1|v_n) & (v_1|P_F(x)) & +0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \\ (v_n|v_1) & \dots & (v_n|v_n) & (v_n|P_F(x)) & +0 \\ (P_F(x)|v_1) & \dots & (P_F(x)|v_n) & (P_F(x)|P_F(x)) & + \|x - P_F(x)\|^2 \end{vmatrix}$$

$$G(v_1, \dots, v_n, x) = \begin{vmatrix} (v_1 | v_1) & \dots & (v_1 | v_n) & (v_1 | P_F(x)) \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ (v_n | v_1) & \dots & (v_n | v_n) & (v_n | P_F(x)) \\ (P_F(x) | v_1) & \dots & (P_F(x) | v_n) & (P_F(x) | P_F(x)) + \|x - P_F(x)\|^2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} (v_1 | v_1) & \dots & (v_1 | v_n) & (v_1 | P_F(x)) \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ (v_n | v_1) & \dots & (v_n | v_n) & (v_n | P_F(x)) \\ (P_F(x) | v_1) & \dots & (P_F(x) | v_n) & (P_F(x) | P_F(x)) \end{vmatrix} +$$

$$= |G(v_1, \dots, v_n, P_F(x))|$$

$$\begin{vmatrix} (v_1 | v_1) & \dots & (v_1 | v_n) & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ (v_n | v_1) & \dots & (v_n | v_n) & 0 \\ (P_F(x) | v_1) & \dots & (P_F(x) | v_n) & \|x - P_F(x)\|^2 \end{vmatrix}$$

$$= \|x - P_F(x)\|^2 |G(v_1, \dots, v_n)|$$

3.5.2

$P_F(x) \in \text{Vect}(v_1, \dots, v_n) \Rightarrow (v_1, \dots, v_n, P_F(x))$ liée
 $\Rightarrow |G(v_1, \dots, v_n, P_F(x))| = 0$

3.5.1 $\Rightarrow |G(v_1, \dots, v_n, x)| = \underbrace{\|x - P_F(x)\|^2}_{=(d(x, F))^2} |G(v_1, \dots, v_n)|$

D'où $d(x, F) = \sqrt{\frac{|G(v_1, \dots, v_n, x)|}{|G(v_1, \dots, v_n)|}}$

3.6.1 $\det(v_1, \dots, v_n) = \begin{vmatrix} 1 & \dots & 1 \\ & \ddots & \\ 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$

où B_c la base canonique de \mathbb{R}^n

D'où (v_1, \dots, v_n) est une famille libre de \mathbb{R}^n .

3.6.2 $\begin{cases} \text{Si } i \leq j; (v_i | v_j) = i \\ \text{Si } i > j; (v_i | v_j) = j \end{cases}$

$\Rightarrow (\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2, (v_i | v_j) = \min(i, j) = a_{ij})$

D'où $A_n = ((v_i | v_j))_{1 \leq i, j \leq n}$, qui est donc une matrice de Gram.

3.6.3

i) A_n est une matrice symétrique réelle

Donc elle est orthogonalement diagonalisable.

ii) Soit $\lambda \in Sp(A_n)$, tel que $\lambda > 0$

Soit $X \in M_{n,2}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$ tel que $A_n X = \lambda X$.

3.4.2 \Rightarrow (il existe une matrice $B \in GL_n(\mathbb{R})$ telle que $A_n = {}^t B \cdot B$)

$$\begin{aligned}
A_n X = \lambda X &\Rightarrow {}^t B B X = \lambda \cdot X \\
&\Rightarrow {}^t X \cdot {}^t B B X = {}^t X \cdot (\lambda X) \\
&\Rightarrow {}^t (B X) \cdot (B X) = \lambda ({}^t X \cdot X) \\
&\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \|B X\|^2 = \lambda \|X\|^2 \\ \text{ou } \left\| \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \right\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 \end{array} \right.
\end{aligned}$$

Et on a $\|X\|^2 > 0$ car $X \neq 0$.
 et $\|B X\|^2 > 0$ car $B X \neq 0$, puis $X \neq 0$ et B invertible

D'où $\boxed{\lambda > 0}$

Fin partie 2

Partie 3

4.1 (Cours)

4.2.1 $P_k = X^k$

$$(P_{n_i} | P_{n_j}) = \frac{1}{n_i + n_j + 1}$$

4.2.2

$$|G(P_{n_2}, \dots, P_{n_p})| = \begin{vmatrix} (P_{n_2} | P_{n_2}) & \dots & (P_{n_2} | P_{n_p}) \\ \vdots & & \vdots \\ (P_{n_p} | P_{n_2}) & \dots & (P_{n_p} | P_{n_p}) \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \frac{1}{(n_2+1)+n_2} & \dots & \frac{1}{(n_2+1)+n_p} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{(n_p+1)+n_2} & \dots & \frac{1}{(n_p+1)+n_p} \end{vmatrix}$$

= Δ_p ; le déterminant de Cauchy

ordre p associé à la famille $(n_k+1)_{1 \leq k \leq p}$ et $(n_k)_{1 \leq k \leq p}$

Donc d'après 2.4.3 on a :

$$|G(P_{n_2}, \dots, P_{n_p})| = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq p} ((n_j+1) - (n_i+1)) (n_j - n_i)}{\prod_{1 \leq i, j \leq p} (n_i + 1 + n_j)}$$

$$|G(P_{n_2}, \dots, P_{n_p})| = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq p} (n_j - n_i)^2}{\prod_{1 \leq i, j \leq p} (n_i + 1 + n_j)}$$

4.2.3 $(P_{n_1}, \dots, P_{n_p})$ est une famille libre de $\mathbb{R}[X]$
 Comme famille de polynômes non nuls échelonnée de
 degrés.

4.2.4 Soit $n \in \mathbb{N}$.

Montrons que :

$$d(P_{n_1}, \dots, P_{n_p}) = \frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \prod_{k=1}^p \frac{|n_k - n|}{n_k + n + 1}$$

$(P_{n_1}, \dots, P_{n_p})$ est une base de \mathcal{W}_p .

$$(3.5.2) \Rightarrow d(P_{n_1}, \dots, P_{n_p}) = \sqrt{\frac{|G(P_{n_1}, \dots, P_{n_p}, P_n)|}{|G(P_{n_1}, \dots, P_{n_p})|}}$$

$$(4.2.2) \Rightarrow |G(P_{n_1}, \dots, P_{n_p})| = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq p} (n_j - n_i)^2}{\prod_{1 \leq i, j \leq p} (n_i + 1 + n_j)} \quad (\text{les } n_i \text{ distincts})$$

$$|G(P_{n_1}, \dots, P_{n_p}, P_n)| = ?$$

Cas 1 : Si $n \in \{n_1, \dots, n_p\}$

$$P_n \in \mathcal{W}_p \Rightarrow d(P_{n_1}, \dots, P_{n_p}) = 0$$

$$\text{et } \prod_{k=1}^p \frac{|n_k - n|}{n_k + n + 1} = 0$$

Alors l'égalité voulue est vérifiée


Cas 2 : Si $n \notin \{n_1, \dots, n_p\}$

Alors les entiers n_1, \dots, n_p, n sont distincts
 deux à deux.

D'après (4.2.2) on a :

$$|G(P_{n_2}, \dots, P_{n_p}, \mathbb{I}_n)| = \frac{\left[\prod_{1 \leq i < j \leq p} (n_j - n_i)^2 \right] \cdot \left[\prod_{i=1}^p (n - n_i)^2 \right]}{\left[\prod_{1 \leq i < j \leq p} (n_i + n_j + 1) \right] \left[\prod_{i=1}^p (n + n_i + 1) \right]^2 (n + n + 1)}$$

Schéma illustratif :



Avec $|G(P_{n_2}, \dots, P_{n_p})| = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq p} (n_j - n_i)^2}{\prod_{1 \leq i < j \leq p} (n_i + 2 + n_j)}$

On a :

$$d(P_n, \mathbb{I}_p) = \sqrt{\frac{|G(P_{n_2}, \dots, P_{n_p}, \mathbb{I}_n)|}{|G(P_{n_2}, \dots, \mathbb{I}_{n_p})|}} = \frac{\prod_{i=2}^p |n - n_i|}{\left(\prod_{i=1}^p (n + n_i + 1) \right) \cdot \sqrt{2n+1}}$$

4.3.1 Il s'agit de montrer que :

$$\exists! (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n, \Psi(a_1, \dots, a_n) = \inf_{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n} \Psi(x_1, \dots, x_n)$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} \Psi(x_1, \dots, x_n) &= \int_0^1 (1 - a_1 t - \dots - a_n t^n)^2 dt \\ &= \left(1 - a_1 x - \dots - a_n x^n \mid 1 - a_1 x - \dots - a_n x^n \right)_2 \\ &= \| 1 - a_1 x - \dots - a_n x^n \|_2^2 \\ &= \| 1 - (a_1 x + \dots + a_n x^n) \|_2^2 \end{aligned}$$

$$\Psi(x_1, \dots, x_n) = \left(d(1, a_1 x + \dots + a_n x^n) \right)_2^2$$

Alors il s'agit de montrer que :

$$\exists! (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n, \left(d(1, a_1 x + \dots + a_n x^n) \right)_2^2 = \inf_{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n} \left(d(1, x_1 x + \dots + x_n x^n) \right)_2^2$$

Càd :

$$\exists! (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n, d(1, a_1 x + \dots + a_n x^n) = \inf_{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n} d(1, x_1 x + \dots + x_n x^n)$$

Notons $F = \{ x_1 x + \dots + x_n x^n \mid (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \}$

Il s'agit de montrer que :

$$\exists! Q \in F, d(1, Q) = \inf_{P \in F} (d(1, P)) = d(1, F)$$

Calc : $(\exists! Q \in F, d(1, Q) = d(1, F))$

Ce qui est vrai car F est un sev de dimension finie ($=n$) de l'espace préhilbertien réel $(\mathbb{R}[X], (\cdot, \cdot))$

4.3.2

Soit (a_1, \dots, a_n) l'unique point de \mathbb{R}^n dans (4.3.1)

Càd $Q(x) = a_1x + \dots + a_nx^n$ est l'unique élément de F vérifiant $d(1, Q) = d(1, F)$.

$$\begin{aligned} \Psi(a_1, \dots, a_n) &= \|1 - Q\|_2^2 \\ &= (d(1, F))^2 \quad (\text{on applique (4.2.4)}) \end{aligned}$$

On a $F = \text{Vect}(X, \dots, X^n) = \text{Vect}(\mathbb{P}_1, \dots, \mathbb{P}_n)$

Alors :

$$\Psi(a_1, \dots, a_n) = (d(\mathbb{P}_0, F))^2 \quad \left\{ \begin{array}{l} r=0 \\ n_1=1 \\ \vdots \\ n_n=n \end{array} \right.$$

$$\stackrel{(4.2.4)}{=} \left(\frac{1}{\sqrt{2 \times 0 + 1}} \prod_{k=1}^n \frac{|k-0|}{(k+0+1)} \right)^2$$

$$= \left(\prod_{k=1}^n \frac{k}{k+1} \right)^2 \quad (\text{Produit télescopique})$$

∴

$$\Psi(a_1, \dots, a_n) = \frac{1}{(n+1)^2}$$

Fin