

## COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES – A – (XLC)

(Durée : 4 heures)

L'utilisation des calculatrices n'est pas autorisée pour cette épreuve.

\*\*\*

*On se propose d'étudier des algèbres d'endomorphismes remarquables d'espaces vectoriels de dimension infinie.*

**Préambule**

Une racine  $n$ -ième de l'unité est dite *primitive* si elle engendre le groupe des racines  $n$ -ième de l'unité.

Dans le problème, tous les espaces vectoriels ont pour corps de base le corps des nombres complexes  $\mathbf{C}$ . Si  $\mathcal{E}$  est un espace vectoriel, l'algèbre des endomorphismes de  $\mathcal{E}$  est notée  $\mathcal{L}(\mathcal{E})$  et le groupe des automorphismes de  $\mathcal{E}$  est noté  $\mathrm{GL}(\mathcal{E})$ . On note  $\mathrm{Id}_{\mathcal{E}}$  l'application identité de  $\mathcal{E}$ . Si  $u \in \mathcal{L}(\mathcal{E})$ , on note  $\mathbf{C}[u]$  la sous-algèbre  $\{P(u) \mid P \in \mathbf{C}[X]\}$  de  $\mathcal{L}(\mathcal{E})$  des polynômes en  $u$ .

On note  $\mathbf{C}^{\mathbf{Z}}$  l'espace vectoriel des fonctions de  $\mathbf{Z}$  dans  $\mathbf{C}$ . Si  $f$  est une fonction de  $\mathbf{Z}$  dans  $\mathbf{C}$ , on note  $\mathrm{Supp}(f)$  l'ensemble des  $k \in \mathbf{Z}$  tels que  $f(k) \neq 0$ . On appelle cet ensemble le *support* de  $f$ . Dans tout le problème,  $V$  désigne l'ensemble des fonctions de  $\mathbf{Z}$  dans  $\mathbf{C}$  dont le support est un ensemble fini.

**I - Opérateurs sur les fonctions à support fini**

**1a.** Montrer que  $V$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbf{C}^{\mathbf{Z}}$ . Étant donné  $f \in \mathbf{C}^{\mathbf{Z}}$ , on définit  $E(f) \in \mathbf{C}^{\mathbf{Z}}$  par  $E(f)(k) = f(k+1)$ ,  $k \in \mathbf{Z}$ .

**1b.** Montrer que  $E \in \mathcal{L}(\mathbf{C}^{\mathbf{Z}})$  et que  $V$  est stable par  $E$ .

Dans la suite,  $E$  désignera uniquement l'endomorphisme de  $V$  induit.

**2.** Montrer que  $E \in \mathrm{GL}(V)$ .

**3.** Pour  $i \in \mathbf{Z}$ , on définit  $v_i$  dans  $\mathbf{C}^{\mathbf{Z}}$  par

$$v_i(k) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = i, \\ 0 & \text{si } k \neq i. \end{cases}$$

**3a.** Montrer que la famille  $\{v_i\}_{i \in \mathbf{Z}}$  est une base de  $V$ .

**3b.** Calculer  $E(v_i)$ .

Soient  $\lambda, \mu \in \mathbf{C}^{\mathbf{Z}}$ . On définit les applications linéaires  $F, H \in \mathcal{L}(V)$  respectivement par

$$H(v_i) = \lambda(i)v_i \quad \text{et} \quad F(v_i) = \mu(i)v_{i+1}, \quad i \in \mathbf{Z}.$$

**4.** Montrer que  $H \circ E = E \circ H + 2E$  si et seulement si pour tout  $i \in \mathbf{Z}$ ,  $\lambda(i) = \lambda(0) - 2i$ .

**Dans la suite de cette partie I (mais pas dans les parties suivantes), on suppose que les conditions de la question 4 sont vérifiées.**

**5.** Montrer que  $E \circ F = F \circ E + H$  si et seulement si pour tout  $i \in \mathbf{Z}$ ,

$$\mu(i) = \mu(0) + i(\lambda(0) - 1) - i^2.$$

**6a.** Montrer que pour  $f \in V$ , l'espace vectoriel engendré par les  $H^n(f)$ ,  $n \in \mathbf{N}$ , est de dimension finie.

**6b.** En déduire qu'un sous-espace non réduit à  $\{0\}$  de  $V$ , stable par  $H$ , contient au moins un des  $v_i$ .

**Dans la suite de cette partie I (mais pas dans les parties suivantes), on suppose que les conditions de la question 5 sont vérifiées et que  $\lambda(0) = 0$ ,  $\mu(0) = 1$ .**

**7a.** Montrer que  $F \in \text{GL}(V)$ .

**7b.** Montrer que  $E$  et  $F$  ne sont pas d'ordre fini dans le groupe  $\text{GL}(V)$ .

**7c.** Calculer le noyau de  $H$  et montrer que  $H^r \neq \text{Id}_V$  pour  $r \geq 1$ .

**8.** On note  $\mathbf{C}[X]$  l'algèbre des polynômes à coefficients complexes en une indéterminée  $X$ .

**8a.** Montrer que  $\mathbf{C}[E]$  est isomorphe (en tant qu'algèbre) à  $\mathbf{C}[X]$ .

**8b.** Montrer que  $\mathbf{C}[F]$  est isomorphe (en tant qu'algèbre) à  $\mathbf{C}[X]$ .

**8c.** Montrer que  $\mathbf{C}[H]$  est isomorphe (en tant qu'algèbre) à  $\mathbf{C}[X]$ .

## II - Intermède

**Dans toute la suite du problème, on fixe un entier impair  $\ell \geq 3$  et  $q$  une racine primitive  $\ell$ -ième de l'unité.**

**9.** Montrer que  $q^2$  est une racine primitive  $\ell$ -ième de l'unité.

Soient  $W_\ell = \bigoplus_{0 \leq i < \ell} \mathbf{C}v_i$  et  $a \in \mathbf{C}^*$ .

10. On considère l'élément  $G_a$  de  $\mathcal{L}(W_\ell)$  dont la matrice dans la base  $\{v_i\}_{0 \leq i < \ell}$  est :

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \vdots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

10a. Calculer  $G_a^\ell$ . Montrer que  $G_a$  est diagonalisable.

10b. Soit  $b$  une racine  $\ell$ -ième de  $a$ . Calculer les vecteurs propres de  $G_a$  et les valeurs propres associées en fonction de  $b$ ,  $q$  et des  $v_i$ .

On définit une application linéaire  $P_a : V \rightarrow V$  par  $P_a(v_i) = a^p v_r$  où pour  $i \in \mathbf{Z}$ , on définit  $r$  et  $p$  respectivement comme le reste et le quotient de la division euclidienne  $i$  par  $\ell$ ; autrement dit,  $i = p\ell + r$  où  $0 \leq r < \ell$  et  $p \in \mathbf{Z}$ .

11. Montrer que  $P_a$  est un projecteur d'image  $W_\ell$ .

### III - Opérateurs quantiques

12. Montrer que  $H \circ E = q^2 E \circ H$  si et seulement si pour tout  $i \in \mathbf{Z}$ ,  $\lambda(i) = \lambda(0)q^{-2i}$ .

Dans la suite du problème, on suppose que les conditions de la question 12 sont vérifiées et que  $\lambda(0) \neq 0$ .

13. Montrer que  $H \in \text{GL}(V)$ .

14. Montrer que  $E \circ F = F \circ E + H - H^{-1}$  si et seulement si pour tout  $i \in \mathbf{Z}$ ,

$$\mu(i) = \mu(i-1) + \lambda(0)q^{-2i} - \lambda(0)^{-1}q^{2i}.$$

Dans la suite du problème, on suppose que les conditions de la question 14 sont vérifiées.

15a. Montrer que  $\lambda$  et  $\mu$  sont périodiques sur  $\mathbf{Z}$ , de périodes divisant  $\ell$ .

15b. Montrer que la période de  $\lambda$  est égale à  $\ell$ .

15c. Montrer que la période de  $\mu$  est aussi égale à  $\ell$ .

16. Soit  $C = (q - q^{-1})E \circ F + q^{-1}H + qH^{-1}$  avec  $H^{-1}$  l'inverse de  $H$ .

16a. Montrer que  $C = (q - q^{-1})F \circ E + qH + q^{-1}H^{-1}$ .

16b. Pour  $i \in \mathbf{Z}$ , montrer que  $v_i$  est un vecteur propre de  $C$ .

16c. En déduire que  $C$  est une homothétie de  $V$  dont on calculera le rapport  $R(\lambda(0), \mu(0), q)$  en fonction de  $\lambda(0)$ ,  $\mu(0)$  et  $q$ .

**16d.** On fixe  $q$  et  $\lambda(0)$ . Montrer que l'application  $\mu(0) \mapsto R(\lambda(0), \mu(0), q)$  est une bijection de  $\mathbf{C}$  sur  $\mathbf{C}$ .

**16e.** On fixe  $q$  et  $\mu(0)$ . Montrer que l'application  $\lambda(0) \mapsto R(\lambda(0), \mu(0), q)$  est une surjection de  $\mathbf{C}^*$  sur  $\mathbf{C}$  mais pas une bijection.

#### IV - Opérateurs quantiques modulaires

Soient  $\ell, W_\ell, a, P_a$  comme dans la partie II. On dit qu'un élément  $\phi$  de  $\mathcal{L}(V)$  est *compatible* avec  $P_a$  si  $P_a \circ \phi \circ P_a = P_a \circ \phi$ .

**17a.** Montrer que si  $\phi \in \mathcal{L}(V)$  commute avec  $P_a$ , alors  $\phi$  est compatible avec  $P_a$ .

**17b.** Montrer que  $H$  et  $H^{-1}$  sont compatibles avec  $P_a$ .

Soit  $\mathcal{U}_q$  l'ensemble des endomorphismes  $\phi \in \mathcal{L}(V)$  qui sont compatibles avec  $P_a$ .

**18.** Montrer que  $\mathcal{U}_q$  est une sous-algèbre de  $\mathcal{L}(V)$ .

**19.** Montrer que  $E \in \mathcal{U}_q$  et  $F \in \mathcal{U}_q$ .

**20a.** Montrer qu'il existe un unique morphisme d'algèbre  $\Psi_a : \mathcal{U}_q \rightarrow \mathcal{L}(W_\ell)$  tel que

$$\forall \phi \in \mathcal{U}_q, \quad \Psi_a(\phi) \circ P_a = P_a \circ \phi.$$

**20b.** Montrer que  $\phi \in \mathcal{U}_q$  est contenue dans le noyau de  $\Psi_a$  si et seulement si l'image de  $\phi$  est dans le sous-espace de  $V$  engendré par les vecteurs  $v_i - a^p v_r$ ,  $i \in \mathbf{Z}$ , où  $i = p\ell + r$  est la division euclidienne de  $i$  par  $\ell$ .

**21.** On étudie dans cette question  $\Psi_a(E)$ .

**21a.** Déterminer  $\Psi_a(E)(v_0)$ .

**21b.** En déduire  $\Psi_a(E^\ell)$ .

**21c.** Calculer la dimension du sous-espace vectoriel  $\mathbf{C}[\Psi_a(E)]$ .

**21d.** Calculer les vecteurs propres de  $\Psi_a(E)$ .

**22.** Soit  $W$  un sous-espace non nul de  $W_\ell$  stable par  $\Psi_a(H)$ .

**22a.** Montrer que  $W$  contient au moins un des vecteurs  $v_i$ .

**22b.** Que dire si  $W$  est de plus stable par  $\Psi_a(E)$  ?

**23.** Donner une condition nécessaire et suffisante sur  $R(\lambda(0), \mu(0), q)$  pour que l'opérateur  $\Psi_a(F)$  soit nilpotent.

\* \*

\*