

## Bac Sciences Mathématiques National 2018

### EXERCICE 1 : (3,5 points )

On rappelle que  $(\mathbb{C}, +, \times)$  est un corps commutatif et que  $(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$  est un anneau unitaire, de zéro la matrice nulle  $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  et d'unité la matrice

$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  et que  $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$  est un espace vectoriel réel.

Pour tout couple  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ , on pose  $M(x, y) = \begin{pmatrix} x & -2y \\ y & x + 2y \end{pmatrix}$

et on considère l'ensemble  $E = \{M(x, y) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$

0,25

1- Montrer que  $E$  est un sous-groupe du groupe  $(M_2(\mathbb{R}), +)$

0,25

2- a) Montrer que  $E$  est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel  $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$

0,5

b) On pose  $J = M(0, 1)$ . Montrer que  $(I, J)$  est une base de l'espace vectoriel réel  $(E, +, \cdot)$

0,5

3- a) Montrer que  $E$  est une partie stable de  $(M_2(\mathbb{R}), \times)$

0,5

b) Montrer que  $(E, +, \times)$  est un anneau commutatif.

4- Soit  $\varphi$  l'application de  $\mathbb{C}^*$  vers  $M_2(\mathbb{R})$  définie par :

$$(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}) ; \varphi(x + iy) = M(x + y, -y) = \begin{pmatrix} x + y & 2y \\ -y & x - y \end{pmatrix}$$

0,5

a) Montrer que  $\varphi$  est un homomorphisme de  $(\mathbb{C}^*, \times)$  vers  $(M_2(\mathbb{R}), \times)$

0,5

b) On pose  $E^* = E - \{O\}$ . Montrer que  $\varphi(\mathbb{C}^*) = E^*$

0,25

c) En déduire que  $(E^*, \times)$  est un groupe commutatif.

0,25

5- Montrer que  $(E, +, \times)$  est un groupe commutatif.

### EXERCICE 2 : (3 points )

Soit  $p$  un nombre premier tel que :  $p = 3 + 4k$  ( $k \in \mathbb{N}^*$ )

0,5

1- Montrer que pour tout entier relatif  $x$ , si  $x^2 \equiv 1[p]$  alors  $x^{p-5} \equiv 1[p]$

2- Soit  $x$  un entier relatif vérifiant :  $x^{p-5} \equiv 1[p]$

0,5

a) Montrer que  $x$  et  $p$  sont premiers entre eux.

0,5

b) Montrer que :  $x^{p-1} \equiv 1[p]$ .

- 0,5 c) Vérifier que :  $2 + (k-1)(p-1) = k(p-5)$   
 0,5 d) En déduire que :  $x^2 \equiv 1[p]$   
 0,5 3- Résoudre dans  $\mathbb{Z}$  l'équation :  $x^{62} \equiv 1[67]$

**EXERCICE 3 : (3,5 points )**

Soit  $m$  un nombre complexe .

I- On considère dans l'ensemble complexes  $\mathbb{C}$  l'équation  $(E_m)$  d'inconnue  $z$  :

$$z^2 + (im + 2)z + im + 2 - m = 0$$

- 0,25 1- a) Vérifier que  $\Delta = (im - 2i)^2$  est le discriminant de l'équation  $(E_m)$   
 0,5 b) Donner, suivant les valeurs de  $m$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $(E_m)$   
 0,5 2- Pour  $m = i\sqrt{2}$ , écrire les deux racines de l'équation  $(E_m)$  sous la forme exponentielle.  
 II- Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$   
 On considère les points  $A, \Omega, M$  et  $M'$  d'affixes respectifs  $a = -1 - i, \omega = i, m$   
 et  $m' = -im - 1 + i$   
 1- Soit  $R$  la rotation d'angle  $-\frac{\pi}{2}$  qui transforme  $M$  en  $M'$   
 0,25 a) Vérifier que  $\Omega$  est le centre de  $R$   
 0,5 b) Déterminer l'affixe  $b$  de  $B$ , où  $B$  est le point tel que :  $A = R(B)$   
 0,5 2- a) Vérifier que :  $m' - a = \frac{\omega - a}{\omega - b}(m - b)$   
 0,5 b) En déduire que les points  $A, M$  et  $M'$  sont alignés si et seulement si les points  $A, B, \Omega$  et  $M$  sont cocycliques .  
 0,5 c) Montrer que l'ensemble des points  $M$  tel que les points  $A, M$  et  $M'$  soient alignés  
 Est un cercle dont on déterminera le centre et le rayon .

**EXERCICE 4 : (7,5 points )**

Partie I :

- 0,5 1- a) Montrer que :  $(\forall x \in ]0, +\infty[) ; \int_0^x \frac{t}{1+t} dt = x - \ln(1+x)$   
 b) En utilisant le changement de variable  $u = t^2$ , montrer que :  
 0,5  $(\forall x \in ]0, +\infty[) ; \int_0^x \frac{t}{1+t} dt = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} \frac{1}{1+\sqrt{u}} du$

0,5 c) En déduire que :  $(\forall x \in ]0, +\infty[) ; \frac{1}{2(1+x)} \leq \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \leq \frac{1}{2}$

0,25 2- Déterminer  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$

**Partie II :**

On considère la fonction  $f$  définie sur  $]0, +\infty[$  : 
$$\begin{cases} f(x) = \left(\frac{x+1}{x}\right) \ln(1+x) & ; x \neq 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

et soit  $(C)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$

0,25 1- a) Montrer que  $f$  est continue à droite en 0

b) Montrer que  $f$  est dérivable à droite en 0

0,5 ( On pourra utiliser le résultat de la question I.2)

0,75 c) Calculer :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$  puis interpréter graphiquement le résultat obtenu.

0,5 2- a) Montrer que  $f$  est dérivable sur  $]0, +\infty[$  , puis vérifier que :

$$(\forall x \in ]0, +\infty[) ; f'(x) = \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$$

0,25 b) En déduire que  $f$  est strictement croissante sur  $]0, +\infty[$

0,25 c) Vérifier que :  $f([0, +\infty[) = [1, +\infty[$

3- Représenter graphiquement la courbe  $(C)$

0,5 ( On construira la demi-tangente à droite au point d'abscisse 0)

**Partie III :**

1- On considère la fonction  $g$  définie sur  $]0, +\infty[$  par :  $g(x) = f(x) - x$

0,5 a) Montrer que :  $(\forall x \in ]0, +\infty[) ; 0 < f'(x) \leq \frac{1}{2}$

0,5 b) En déduire que  $g$  est strictement décroissante sur  $]0, +\infty[$  puis montrer que  $g(]0, +\infty[) = ]-\infty, 1[$

0,25 c) Montrer que l'équation  $f(x) = x$  admet une solution unique  $\alpha$  sur  $]0, +\infty[$

2- Soit  $a$  un réel de l'intervalle  $]0, +\infty[$ .

On considère la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par :  $u_0 = a$  et  $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} = f(u_n)$

0,25 a) Montrer que :  $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n > 0$

0,5

b) Montrer que :  $(\forall n \in \mathbb{N}) ; |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$

0,5

c) Montrer par récurrence que :  $(\forall n \in \mathbb{N}) ; |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |a - \alpha|$

0,25

d) En déduire que la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers  $\alpha$

**EXERCICE 5 : (2,5 points )**

On considère la fonction  $F$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $F(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$

0,5

1- Montrer que  $F$  est continue et strictement croissante sur  $\mathbb{R}$

0,5

2- a) Montrer que :  $(\forall x \in ]0, +\infty[) ; F(x) \geq x$ . En déduire  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$

0,5

b) Montrer que  $F$  est impaire, en déduire  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$

0,5

c) Montrer que  $F$  est une bijection de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$

0,5

d) Montrer que la bijection réciproque  $G$  de la fonction  $F$  est dérivable en  $0$ , puis calculer  $G'(0)$