

Concours d'accès en deuxième année du Cycle  
d'Ingénieurs d'Etat  
INPT – Rabat – 10 Juillet 2003

NOM : .....	PRENOM : .....
N° CIN : .....	N° PLACE : .....

QCM DE MATHEMATIQUES  
DUREE : 1 H 45

Ce fascicule comporte 16 questions

DIRECTIVES

- Aucun feuillet ne doit être séparé du fascicule de questions qui sera rendu impérativement avec les réponses pour valider le QCM
- Un seul fascicule est distribué par candidat
- L'usage de la calculatrice est interdit
- Pour chaque question, il y a 3 propositions numérotées 1, 2 et 3
- Il y a toujours une bonne réponse et une seule parmi les 3 proposées
- Répondez au QCM en utilisant le « Document Réponse » qui se trouve à la fin du fascicule
- Pour chaque question de la grille de réponses du « Document Réponse », remplissez la case correspondante par le numéro de la proposition que vous jugez bonne

BAREMES ET EVALUATION

- Réponse exacte : 1 point
- Réponse inexacte ou réponse multiple : 0 point
- Absence de réponse : 0 point

### MATHEMATIQUES (SERIE 3)

**Q 1:** La transformée de Fourier de la distribution tempérée définie par  $f(x) = \sin(2\pi ax)$ ,  $a \in \mathbb{R}$ , est donnée par:

- 1)  $\frac{\delta_{a-\frac{\delta}{2}}}{2i}$
- 2)  $\frac{\delta_{2\pi a-\frac{\delta}{2}}}{2i}$
- 3)  $\frac{\delta_{\frac{a}{2}-\frac{\delta}{2}}}{2i}$

**Q 2:** La transformée de Fourier de la suite de distributions tempérées définie par  $f_n(x) = (\cos \frac{x}{\sqrt{n}})^n$ , pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , converge dans  $S'$  (espace des distributions tempérées sur  $\mathbb{R}$ )

vers:

- 1)  $\sqrt{2\pi} e^{-\pi x^2}$
- 2)  $e^{-2\pi x^2}$
- 3)  $\sqrt{2\pi} e^{-2\pi x^2}$

**Q 3:** On considère l'équation différentielle (E):  $y' + y = f$ , avec  $f(t) = e^{-t}$ , pour  $t > 0$  et nulle pour  $t < 0$ . La transformée de Laplace de la solution de (E) nulle pour  $t < 0$  et vérifiant  $y(0) = 1$  est donnée par:

- 1)  $\frac{p+2}{(p+1)^2}$
- 2)  $\frac{1}{(p+1)^2}$
- 3)  $\frac{p-1}{(p+1)^2}$

**Q 4:** La distribution "peigne de Dirac"  $\Delta = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - na)$ ,  $a$  réel quelconque, et sa transformée de Fourier vérifient:

- 1)  $\Delta = \frac{1}{a} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\frac{2in\pi x}{a}}$  et la transformée de Fourier de  $\Delta$  est donnée par  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f - na)$
- 2)  $\Delta = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-2in\pi a n t}$  et la transformée de Fourier de  $\Delta$  est donnée par  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f - \frac{n}{a})$
- 3)  $\Delta = \frac{1}{a} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\frac{2in\pi x}{a}}$  et la transformée de Fourier de  $\Delta$  est donnée par  $a \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-2in\pi a n f}$

**Q 5:** La série entière  $\sum \frac{z^n}{n!} \cos(n\theta)$  ( $n \geq 0$ ):

- 1) Converge uniformément pour tout réel  $\theta$  vers  $e^{z \cos(\theta)} \sin(z \sin \theta)$
- 2) Converge uniformément pour tout réel  $\theta$  vers  $e^{z \cos(\theta)} \cos(z \sin \theta)$
- 3) Est le développement en série de Fourier de  $e^{z \cos(\theta)} \sin(z \sin \theta)$

**Q 6:** La série donnée par  $g(z) = 1 - 3 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{n-1}}{z^n} + 8 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{n-1}}{z^n}$  est le développement en série de Laurent de la fonction  $f(z) = \frac{z^2-1}{(z+2)(z+3)}$  sur le domaine suivant:

- 1)  $|z| < 2$
- 2)  $2 < |z| < 3$
- 3)  $|z| > 3$

**Q 7 :** L'intégrale  $\int_{C^+} \frac{e^z}{z+1} dz$ ,  $C^+$  étant un cercle de centre O et de rayon  $r > 1$  parcouru dans le sens trigonométrique direct, vaut:

- 1)  $2i\pi(1 - \frac{1}{e})$
- 2)  $2i\pi(\frac{1}{e} - 1)$
- 3)  $2i\pi$

**Q 8 :** Soit  $f(t) = 1$  sur  $[-a, a]$  avec  $a > 0$  et nulle en dehors de  $[-a, a]$ . Le produit de convolution  $f * f$  est:

- 1) continu sur  $\mathbb{R}$  à support inclus dans  $[-2a, 2a]$
- 2) discontinu en  $-a$  et  $a$  à support inclus dans  $[-2a, 2a]$
- 3) dérivable sur  $\mathbb{R}$  à support inclus dans  $[-2a, 2a]$

**Q 9 :** Soit  $F$  et  $G$  des sous-espaces vectoriels de dimensions finies d'un espace de Hilbert  $E$ . On note  $p_F$  et  $p_G$  les projections orthogonales respectivement sur  $F$  et  $G$ . Si  $F \subset G$  on a:

- 1)  $p_G \circ p_G = p_G$  et  $p_G \circ p_F = p_F$
- 2)  $p_G \circ p_F = p_F \circ p_G = p_G$
- 3)  $(I - p_G)(I - p_F) = I - p_G$  ( $I$  : opérateur identité)

**Q10 :** Soit  $E$  un espace de Hilbert muni du produit scalaire  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  et  $(x_n)$  une suite de  $E$ . On dit que  $(x_n)$  converge faiblement vers un élément  $x \in E$ , ce qu'on note  $(x_n) \rightharpoonup x$ , si pour tout  $y \in E$ , on a  $\langle y, x_n \rangle \rightarrow \langle y, x \rangle$ . On suppose que  $(x_n) \rightharpoonup x$  et  $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$ . On a:

- 1) La convergence de  $(x_n)$  implique la convergence faible de  $(x_n)$  et la limite  $x$  peut ne pas être unique
- 2) La convergence faible de  $(x_n)$  implique la convergence de  $(x_n)$  et la limite  $x$  est unique
- 3) Il existe des formes linéaires de  $E$  qui ne peuvent pas se mettre sous forme d'un produit scalaire

**Q11 :** Soit  $f$  impaire,  $2\pi$  périodique, définie sur  $]0, \pi[$  par  $f(t) = 1$ ,  $f(0)$  et  $f(\pi)$  étant quelconques. On a:

- 1)  $f(t) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{4}{\pi(2p+1)} \sin(2p+1)t$  sur  $]0, \pi[$  et  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$
- 2)  $f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{\pi(2p+1)} \sin(2p)t$  sur  $]0, \pi[$  et  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$
- 3)  $f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{\pi(2p+1)} \sin(2p+2)t$  sur  $]0, \pi[$  et  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = 0$

**Q12 :** La transformée de Fourier de la fonction  $f_a$  définie par  $f_a(x) = \frac{a}{\pi(a^2+x^2)}$  ( $a > 0$ ) est donnée par:

- 1)  $F_a(t) = e^{-\pi a|t|}$
- 2)  $F_a(t) = e^{-2\pi a|t|}$
- 3)  $F_a(t) = e^{-2\pi \frac{a}{|t|}}$

**Q13:** La transformée de Laplace de la fonction  $f_a$  nulle pour  $t < 0$  et égale à  $\frac{1}{a}e^{-\frac{t}{a}}$  ( $a > 0$ ) pour  $t \geq 0$ , vaut:

- 1)  $\frac{1}{ap+1}$  pour  $\text{Re}(p) > -\frac{1}{a}$
- 2)  $\frac{1}{p+\frac{1}{a}}$  pour  $\text{Re}(p) > -\frac{1}{a}$
- 3)  $\frac{1}{ap+1}$  pour  $\text{Re}(p) < \frac{1}{a}$

**Q14:** La limite dans  $\mathcal{D}'$  (espace des distributions sur  $\mathbb{R}$ ) de la suite de fonctions  $f_n(t) = ne^{-n|t|}$ , quand  $n \rightarrow \infty$ , vaut:

- 1) 0
- 2)  $\delta$  ( $\delta$  : Distribution de Dirac)
- 3)  $2\delta$

**Q15:** La dérivée dans  $\mathcal{D}'$  (espace des distributions sur  $\mathbb{R}$ ) de la fonction  $f(t) = Y(t) \cos(t)$ , avec  $Y(t) = 1$  pour  $t > 0$  et  $Y(t) = 0$  pour  $t < 0$ , est donnée par:

- 1)  $-Y(t) \sin(t) + 2\delta$
- 2)  $-Y(t) \cos(t) - \delta$
- 3)  $-Y(t) \sin(t) + \delta$

**Q16:** L'inverse de convolution dans  $\mathcal{D}'_+$  (espace des distributions causales sur  $\mathbb{R}$ ) de la distribution  $\delta'' - 5\delta' + 6\delta$  (i.e., la distribution  $T \in \mathcal{D}'_+$  telle que  $T * (\delta'' - 5\delta' + 6\delta) = \delta$ ), est donné par:

- 1)  $T = Y(t)(e^{3t} - e^{2t})$
- 2)  $T = Y(t)(e^t - e^{2t})$
- 3)  $T = Y(t)(e^{3t} - e^t)$

# Document Réponse

## Partie Mathématique

### SERIE 3

Questions	Réponse :1,2 ou 3	Note
Q1		
Q2		
Q3		
Q4		
Q5		
Q6		
Q7		
Q8		
Q9		
Q10		
Q11		
Q12		
Q13		
Q14		
Q15		
Q16		