



عناصر الإجابة و سلم التقييم

♦ المكون الأول: استرداد المعرف (8 نقط)

سلم التقييم	عناصر الإجابة	رقم السؤال
(3ن)=6×0.50	1- باحة الحركة 2- سيالة عصبية حركية (نابذة) 3 - حساسية شعورية 4 - سيالة عصبية حسية (مركزية) 5 - انعكاس شوكى 6- النخاع الشوكي	.1
(1.5ن)=6×0.25	استجابة مناعية طبيعية : ج- و استجابة مناعية مكتسبة : خلطة: أ-د / خلوية: ب-ه	.2
(3.5ن)=7×0.50	أ- الليف العضلي / ب- طاقة / ج- النخاع العظمي / د- الهرستامين دمامة VIIH / و- الخمات / ز- لمفاويات T ذاكرة.	.3

♦ المكون الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني (12 نقطة)

التمرين الأول(6نقط)

(1.5ن)	أ- فقدان الحركة سببه قطع الألياف العصبية للجذر الأمامي (0.5ن) ب- انحلال الألياف العصبية للجذر الأمامي المرتبطة بالعضلات يرجع إلى انفصالها عن الأجسام الخلوية التي توجد بالمادة الرمادية للنخاع الشوكي (0.5ن) استنتاج : الجذر الأمامي يحتوي على ألياف عصبية حركية (0.5ن)	.1
(1ن)	نستنتج أن هناك علاقة بين العناصر المكونة للمادة الرمادية والمادة البيضاء والعصب. حيث أن الألياف العصبية المتواجدة بالمادة البيضاء والعصب هي امتدادات للأجسام الخلوية المتواجدة بالمادة الرمادية.	.2
(1.5ن)	- رسم تخطيطي صحيح لخلية عصبية (عصبون) (0.5ن) العناصر اللازم ذكرها : جسم خلوي- محوره- تشرنر نهائي (0.75ن)=3×0.25 تحديد كل من المادة البيضاء والمادة الرمادية (0.25ن)	.3
(1ن)	مقارنة : الأجسام الخلوية للخلايا العصبية على مستوى القرن الأمامي منحلة بينما على مستوى القرن الخلفي للمادة الرمادية سليمة.	.4
(1ن)	فيروس Poliovirus يدمر الأجسام الخلوية على مستوى القرن الأمامي للمادة الرمادية مما يؤدي إلى انحلال الألياف العصبية الحركية.	.5

التمرين الثاني(3نقط)

(1.5ن)	سبب موت أغذب فتران المجموعة 1 هو كون عصيات الدفتيريا ورشاحة زرعها قاتلة (1ن) (0.5ن) استنتاج: تؤثر عصيات الدفتيريا عن طريق إفراز مواد قاتلة (السمين) (0.5ن)	.1
(1ن)	لم تمت فتران المجموعة 2 لكونها اكتسبت مناعة ضد عصيات الدفتيريا (0.5ن) لم تمت فتران المجموعة 3 لكون مصل الفتران التي شفيت من الدفتيريا (الممنعة) منحها مناعة مؤقتة (0.5ن)	.2
(0.5ن)	مناعة نوعية.	.3
(1ن)	مناعة نوعية ذات مسلك خلطي (0.5ن) تعليق: لأنها تتم بواسطة مضادات الأجسام الموجودة بالمصل.	.4
(1ن)	تحليل: نلاحظ أنه كلما تأخر حقن المصل المضاد للدفتيريا، كلما زادت نسبة الوفيات عند الأطفال (0.5ن) تفسير: اختلاف نسبة الوفيات بين هؤلاء الأطفال ناتج عن تأخير العلاج بالمصل (0.5ن)	.5
(1ن)	لأن حقن هؤلاء الأطفال بالمصل (الإستعمال) وسيلة علاجية بينما التلقيح وسيلة وقائية.	.6

♦ تقبل كل الإجابات الصحيحة