

المتتاليات العددية

تمرين 1

$$v_n = u_n - \frac{5}{3} ; u_{n+1} = 1 + \frac{2}{5}u_n ; u_0 = 2$$

1- بين أن (v_n) هندسية ثم احسب v_n و u_n بدلالة n

2- احسب : $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} v_k$

الحل

بصفة عامة:

$$v_n = u_n - \frac{b}{b-a} ; u_{n+1} = 1 + \frac{a}{b}u_n ; u_0 = \alpha$$

نجد الأساس : $\frac{a}{b}$

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{5}{3} = 1 + \frac{2}{5}u_n - \frac{5}{3} = \frac{2}{5}(u_n - \frac{5}{3}) = \frac{2}{5}v_n -$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad -7$$

$$\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2 \quad \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\| \quad -8$$

$$\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2 \quad \|x\| - \|y\| \leq \|x + y\| \quad -9$$

$$(\forall t \in \mathbb{R}^*) (\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad (t+1)^n \geq 1 + nt \quad -10$$

$$(\forall \varepsilon > 0) \quad |a| < \varepsilon \Rightarrow a = 0 \quad -11$$

الحل

$$n \in \mathbb{N}^* - \{1\} \quad \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \quad -2$$

$$\text{أو التراجع } n \in \mathbb{N}^* \quad 2^{n+1} \geq \frac{n(n+1)}{2} \quad -3$$

$$2^{n+1} = (1+1)^{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} C_{n+1}^k \geq C_{n+1}^2 = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$n \in \mathbb{N}^* \quad 2^n \geq n+1 \quad -4$$

$$2^n = (1+1)^n = \sum_{k=1}^n C_n^k \geq C_n^0 + C_n^1 = 1+n$$

$$n \geq 3 \quad 2^n \geq \frac{n(n-1)(n-2)}{6} \quad -5$$

$$2^n = (1+1)^n = \sum_{k=1}^n C_n^k \geq C_n^3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$$

$$\text{التراجع } \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad -6$$

$$\text{التراجع } \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad -7$$

$$\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2 \quad \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\| \quad -8$$

$$\forall (x'; y') \in \mathbb{R}^2 \quad |x' - y'| \leq |x'| + |y'| \quad \text{نعلم أن:}$$

$$\text{نضع: } x' = x; y' = y - x \text{ ثم } x' = x - y; y' = y$$

$$\text{نجد: } (1) |x| - |y| \leq |x - y| \text{ ثم } (2) |y| - |x| \leq |x - y|$$

$$\text{من: (1); (2): } \forall (x; y) \in \mathbb{R}^2 \quad \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$$

أو:

$$|x||y| \leq xy \Leftrightarrow -|x||y| \leq -xy$$

$$\Leftrightarrow |x|^2 + |y|^2 - 2|x||y| \leq x^2 + y^2 - 2xy$$

$$\Leftrightarrow [|x| + |y|]^2 \leq (x + y)^2$$

$$\Leftrightarrow \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$$

$$\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2 \quad \|x\| - \|y\| \leq \|x + y\| \quad -9$$

نعوض: $-y$ ب y في 8

$$(\forall t \in \mathbb{R}^+) (\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad (t+1)^n \geq 1 + nt \quad -10$$

بالتراجع:

$$(t+1)^{n+1} = (t+1)(t+1)^n \geq (t+1)(1+nt)$$

$$v_n = v_0 q^n = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{5}\right)^n \quad v_0 = \frac{1}{3}$$

$$u_n = v_n + \frac{5}{3} = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{5}\right)^n + \frac{5}{3}$$

$$S_n = \sum_{i=1}^{n-1} v_i = v_0 \frac{1-q^n}{1-q} = \frac{1}{3} \frac{1 - \left(\frac{2}{5}\right)^n}{1 - \left(\frac{2}{5}\right)}$$

تمرين 2

$$v_n = \frac{1}{u_n - 4}, \quad u_{n+1} = \frac{16}{8 - u_n}, \quad u_0 = 0$$

-1 بين أن (v_n) حسابية ثم احسب v_n و u_n بدلالة n

$$\text{-2 احسب: } S_n = \sum_{k=0}^{n-1} v_k$$

الحل

بصفة عامة:

$$u_0 = \alpha \quad v_n = \frac{1}{u_n - a} \quad u_{n+1} = \frac{a^2}{2a - u_n}$$

نجد الأساس: $-\frac{1}{a}$

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1} - 4} = \frac{1}{\frac{16 - u_n}{4u_n - 4} - 4} = \frac{16 - u_n}{4u_n - 4} + \frac{1}{4} \frac{4}{u_n - 4} = -\frac{1}{4} + v_n$$

$$v_n = v_0 + nr = -\frac{1+n}{4} \quad v_0 = -\frac{1}{4}$$

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} v_k = \frac{n}{2} (v_0 + v_{n-1})$$

$$S_n = \frac{n}{2} \left(-\frac{1}{4} + \left(-\frac{1}{4} - \frac{n-1}{3}\right)\right) = \frac{n}{2} \left(-\frac{1}{6} - \frac{n}{3}\right)$$

تمرين 3

$$n \in \mathbb{N}^* \quad \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \quad -1$$

$$n \in \mathbb{N}^* - \{1\} \quad \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \quad -2$$

$$n \in \mathbb{N}^* \quad 2^{n+1} \geq \frac{n(n+1)}{2} \quad -3$$

$$n \in \mathbb{N}^* \quad 2^n \geq n+1 \quad -4$$

$$n \geq 3 \quad 2^n \geq \frac{n(n-1)(n-2)}{6} \quad -5$$

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad -6$$

$$(t+1)(1+nt) = t + (n+1)t + nt^2 \geq (n+1)t$$

$$(\forall \varepsilon > 0) |a| < \varepsilon \Rightarrow a = 0 \quad \text{-11}$$

افترض أن : $a \neq 0$

نعتبر : $\varepsilon = \frac{|a|}{2}$ إذن : $|a| < \frac{|a|}{2}$ ومنه : $1 < \frac{1}{2}$ تناقض

تمرين 4

$$n \geq 1 \quad u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k \times 2^k}$$

1 - بين أن : $u_n \leq 1$

2- استنتج أن : $(u_n)_{n \geq 1}$ متقاربة

الحل

1 - لنبين أن : $u_n \leq 1$

$$n \geq 1 \quad u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k \times 2^k}$$

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k \times 2^k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \frac{1}{k+1}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$u_n = 1 - \frac{1}{n+1} \leq 1$$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} \quad \text{-2}$$

إذن : $(u_n)_{n \geq 1}$ تزايدية

بما أن : $(u_n)_{n \geq 1}$ تزايدية مكبورة فإن $(u_n)_{n \geq 1}$ متقاربة

تمرين 5

$$n \geq 1 \quad u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$$

1 - بين أن : $u_n \leq 2$

2- استنتج أن : $(u_n)_{n \geq 1}$ متقاربة

الحل

$$n \geq 1 \quad u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$$

1 - لنبين أن : $u_n \leq 2$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right)$$

$$\sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 1 - \frac{1}{n}$$

إذن : $u_n \leq 2$

2- بما أن : $(u_n)_{n \geq 1}$ تزايدية مكبورة فإن $(u_n)_{n \geq 1}$ متقاربة

تمرين 6

حساب : $\lim u_n$

$$n \geq 1 \quad u_n = \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{1}{n^2+k} \quad \text{-1}$$

$$\frac{1}{n^2+2n+1} \leq \frac{1}{n^2+k} \leq \frac{1}{n^2+1} \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{1}{n^2+2n+1} \leq \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{1}{n^2+k} \leq \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{1}{n^2+1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{2n+1}{n^2+2n+1} \leq u_n \leq \frac{2n+1}{n^2+1}$$

إذن : $0 \leq \lim u_n \leq 0$ ومنه : $\lim u_n = 0$

$$n \geq 1 \quad u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} \quad \text{-2}$$

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

إذن : $\lim u_n = 1$

$$n \geq 1 \quad u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n^2+kn+k^2}{n^3} \quad \text{-3}$$

$$\frac{n^2+kn+k^2}{n^3} = \frac{1}{n} + \frac{k}{n^2} + \frac{k^2}{n^3}$$

$$u_n = 1 + \frac{n(n+1)}{2n^2} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}$$

$$\lim u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{2}{6} = \frac{11}{6}$$

$$n \geq 1 \quad u_n = \prod_{k=1}^n \left(\frac{1}{2} \right)^k = \left(\frac{1}{2} \right)^{\sum_{k=1}^n k} = \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{n(n+1)}{2}} \quad \text{-4}$$

بما أن : $-1 < \frac{1}{2} < 1$ فإن : $\lim u_n = 0$

تمرين 7

$f(I) \subset I$ دالة معرفة على مجال I بحيث :

1- ادرس رتبة f^k (مركبة f مرة k) $k \in \mathbb{N}^*$

أ - إذا كان : f تزايدية

ب - إذا كان : f تناقصية

2- نعتبر المتتالية : (u_n)

بحيث : $u_0 \in I \quad u_{n+1} = f(u_n)$

$$w_n = u_{2n+1} \quad ; \quad v_n = u_{2n}$$

بين أن :

أ- إذا كان : f تزايدية على I فإن : (u_n) رتيبة

ب - إذا كان : f تناقصية على I فإن : (v_n) رتيبة

ج - إذا كان : f تناقصية على I فإن : (w_n) رتيبة

د - $\lim v_n = \lim w_n = l \Leftrightarrow \lim u_n = l \quad (l \in \mathbb{R})$

3- تطبيق :

نعتبر: $N = \sup(2n_1; 2n_2 + 1)$
 إذن: $(\exists N \in \mathbb{N}) (k \geq N) |u_k - l| \leq \varepsilon$
 \leftarrow
 نعتبر: $\varepsilon > 0$

$(\exists n_1 \in \mathbb{N}) (k \geq n_1) |u_k - l| \leq \varepsilon$
 إذن: $(\exists n_1 \in \mathbb{N}) (2k \geq n_1) |u_{2k} - l| \leq \varepsilon$
 $(\exists n_1 \in \mathbb{N}) \left(k \geq \frac{n_1}{2}\right) |u_{2k} - l| \leq \varepsilon$

نعتبر: $N = E\left(\frac{n_1}{2}\right) + 1$

إذا كان: $k \geq E\left(\frac{n_1}{2}\right) + 1$ فإن: $k \geq \frac{n_1}{2}$

إذن: $(\exists N \in \mathbb{N}) (k \geq N) |u_{2k} - l| \leq \varepsilon$
 ومنه: $(\exists N \in \mathbb{N}) (k \geq N) |v_k - l| \leq \varepsilon$
 نفس البرهنة بالنسبة ل: (w_n)
 3- تطبيق:

نعتبر: $n \in \mathbb{N}$ ، $u_{n+1} = \frac{1}{u_n + 1}$ ، $u_0 = 1$

نعتبر: $(D_f = \mathbb{R} - \{-1\})$ $f(x) = \frac{1}{1+x}$

$$f'(x) = \frac{-1}{(1+x)^2}$$

f تناقصية

$$u_0 = 1; u_1 = \frac{1}{2}; u_2 = \frac{2}{3}; u_3 = \frac{3}{5}$$

أ- رتابة: (v_n) ؛ (w_n)

$$v_0 \geq v_1$$

بالترجع نبين أن: (v_n) تناقصية

$$v_0 \geq v_1$$

نفترض أن: $v_n \geq v_{n+1}$

بما أن: f تناقصية على $\mathbb{R} - \{-1\}$ فإن: $f \circ f$ تزايدية على

$$u_n \in \mathbb{R} - \{-1\} \text{ و } \mathbb{R} - \{-1\}$$

فإن: $(v_n) \geq f \circ f(v_n) \geq f \circ f(v_{n+1})$ إذن: $v_{n+1} \geq v_{n+2}$

إذن: (v_n) تناقصية

بنفس الطريقة نجد: (w_n) تزايدية

ب- بين أن: $(\forall n \in \mathbb{N}) w_n \leq v_n$

بالترجع:

$$w_0 \leq v_0$$

نفترض أن: $w_n \leq v_n$

إذن: $f \circ f(w_n) \leq f \circ f(v_n)$

$$w_{n+1} \leq v_{n+1}$$

أ- نعتبر: $n \in \mathbb{N}$ ، $u_{n+1} = \frac{1}{u_n + 1}$ ، $u_0 = 1$

أ- ادرس رتابة: (v_n) ؛ (w_n)

ب- بين أن: $(\forall n \in \mathbb{N}) w_n \leq v_n$

ج- بين أن: $(\forall n \in \mathbb{N}) \frac{1}{2} \leq u_n \leq 1$

د- بين أن: $(\forall n \in \mathbb{N}^*) |u_{n+1} - u_n| \leq \frac{1}{n}$

ه- بين أن: (v_n) و (w_n) متحاديتان ثم حدد نهايتهما

و- استنتج أن: (u_n) متقاربة ثم حدد نهايتها

الحل

$f(I) \subset I$ دالة معرفة على مجال I بحيث:

1- رتابة f^k (مركبة f مرة k) $k \in \mathbb{N}^*$

أ- إذا كان: f تزايدية فإن: f^k تزايدية

ب- إذا كان: f تناقصية فإن: f^{2k} تزايدية و f^{2k+1} تناقصية

$$-2 \quad u_0 \in I \quad u_{n+1} = f(u_n)$$

$$v_n = u_{2n} \Rightarrow v_{n+1} = f \circ f(v_n)$$

$$w_n = w_{2n+1} \Rightarrow w_{n+1} = f \circ f(w_n)$$

بما أن: $u_0 \in I$ و $f(I) \subset I$ و $u_{n+1} = f(u_n)$

نبين بالترجع أن: $u_n \in I$

نفس الشيء بالنسبة ل: (v_n) و (w_n)

أ- إذا كان: f تزايدية على I فإن: (u_n) رتبية

نفترض أن: $u_0 \leq u_1$

لنبين أن: (u_n) تزايدية بالترجع

$$u_0 \leq u_1$$

نفترض أن: $u_n \leq u_{n+1}$ بما أن: f تزايدية على I و

$$u_n \in I$$

فإن: $f(u_n) \leq f(u_{n+1})$ إذن: $u_{n+1} \leq u_{n+2}$

ب- إذا كان: f تناقصية على I فإن: (v_n) رتبية

نطبق أ على $f \circ f$ و (v_n)

ج- إذا كان: f تناقصية على I فإن: (w_n) رتبية

نطبق أ على $f \circ f$ و (w_n)

د- $\lim v_n = \lim w_n = l \Leftrightarrow \lim u_n = l$ ($l \in \mathbb{R}$)

\Rightarrow

نعتبر: $\varepsilon > 0$

$$(\exists n_1 \in \mathbb{N}) (k \geq n_1) |v_k - l| \leq \varepsilon$$

$$(\exists n_2 \in \mathbb{N}) (k \geq n_2) |w_k - l| \leq \varepsilon$$

إذن: $(\exists n_1 \in \mathbb{N}) (2k \geq 2n_1) |u_{2k} - l| \leq \varepsilon$

$$(\exists n_2 \in \mathbb{N}) (2k + 1 \geq 2n_2 + 1) |u_{2k+1} - l| \leq \varepsilon$$

نعتبر : $\lim v_n = \lim w_n = l$

بما أن : $\frac{1}{2} \leq u_n \leq 1$

فإن : $\frac{1}{2} \leq v_n \leq 1 ; \frac{1}{2} \leq w_n \leq 1$

إذن : $\frac{1}{2} \leq l \leq 1$

لدينا : $w_n = f(v_n)$

و f متصلة في l و $\lim v_n = l$

إذن : $\lim w_n = f(\lim v_n)$

ومنه : $l = f(l)$

نجد : $l = \frac{-1-\sqrt{5}}{2} ; l = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$

بما أن : $\frac{1}{2} \leq l \leq 1$

فإن : $l = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$

إذن : $\lim v_n = \lim w_n = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$

و - استنتج أن : (u_n) متقاربة ثم حدد نهايتها

من 2-د - $\lim v_n = \lim w_n = l \Leftrightarrow \lim u_n = l (l \in \mathbb{R})$

إذن : $\lim u_n = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$

تمرين 8

نعتبر : $n \in \mathbb{N} , u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n + 1} , u_0 = 1$

؛ $v_n = u_{2n} ; w_n = u_{2n+1}$

أ- ادرس رتبة : (v_n) ؛ (w_n)

ب- بين أن : $(\forall n \in \mathbb{N}) v_n \leq w_n$

ج - بين أن : $(\forall n \in \mathbb{N}) 1 \leq u_n \leq \frac{3}{2}$

د - بين أن : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) |u_{n+1} - u_n| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$

هـ - بين أن : (v_n) و (w_n) متحاديان ثم حدد نهايتهما

و - استنتج أن : (u_n) متقاربة ثم حدد نهايتها

الحل

نعتبر : $(D_f = \mathbb{R} - \{-1\}) f(x) = 1 + \frac{1}{1+x}$

$$f'(x) = \frac{-1}{(1+x)^2}$$

f تناقصية

ج - لنبين أن : $(\forall n \in \mathbb{N}) \frac{1}{2} \leq u_n \leq 1$

بالترجع :

لدينا : $\frac{1}{2} \leq u_0 \leq 1$

نفترض أن : $\frac{1}{2} \leq u_n \leq 1$

بما أن : f تناقصية على $\mathbb{R} - \{-1\}$ و $u_n \in \mathbb{R} - \{-1\}$

فإن : $f\left(\frac{1}{2}\right) \geq f(u_n) \geq f(1)$

ومنه : $\frac{2}{3} \geq u_{n+1} \geq \frac{1}{2}$

إذن : $\frac{1}{2} \leq u_{n+1} \leq 1$

د - بين أن : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) |u_{n+1} - u_n| \leq \frac{1}{n}$

بالترجع :

لدينا : $\frac{1}{6} \leq \frac{1}{2} ; |u_2 - u_1| = \frac{1}{6}$

إذن : $|u_2 - u_1| \leq \frac{1}{2}$

نفترض أن : $|u_{n+1} - u_n| \leq \frac{1}{n}$

$$|u_{n+2} - u_{n+1}| = \frac{|u_{n+1} - u_n|}{|1+u_n||1+u_{n+1}|}$$

$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+u_n} \leq \frac{2}{3} ; \frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+u_{n+1}} \leq \frac{2}{3}$

إذن : $\frac{1}{n} \times \frac{4}{9} \leq \frac{1}{n+1}$ و $\frac{|u_{n+1} - u_n|}{|1+u_n||1+u_{n+1}|} \leq \frac{1}{n} \times \frac{4}{9}$

إذن : $\frac{|u_{n+1} - u_n|}{|1+u_n||1+u_{n+1}|} \leq \frac{1}{n+1}$

ومنه : $|u_{n+2} - u_{n+1}| \leq \frac{1}{n+1}$

هـ - لنبين أن : (v_n) و (w_n) متحاديان ثم نحدد نهايتهما

من 3-د لدينا : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) |u_{n+1} - u_n| \leq \frac{1}{n}$

إذن : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) |u_{2n+1} - u_{2n}| \leq \frac{1}{2n}$

ومنه : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) v_n - w_n \leq \frac{1}{2n}$

إذن : $\lim(v_n - w_n) = 0$

و لدينا : (w_n) تزايدية و (v_n) تناقصية

إذن : (v_n) و (w_n) متحاديان

$$u_0 = 1; u_1 = \frac{3}{2}; u_2 = \frac{7}{5}; u_3 = \frac{17}{12}$$

أ- رتابة : (v_n) ؛ (w_n)

$$v_0 \leq v_1$$

بالترجع نبين أن : (v_n) تزايدية

لدينا : $v_0 \leq v_1$

نفترض أن : $v_n \leq v_{n+1}$

بما أن : f تناقصية على $\mathbb{R} - \{-1\}$ فإن : $f \circ f$ تزايدية على

$\mathbb{R} - \{-1\}$ و $u_n \in \mathbb{R} - \{-1\}$

فإن : $f \circ f (v_n) \leq f \circ f (v_{n+1})$ إذن : $v_{n+1} \leq v_{n+2}$

إذن : (v_n) تزايدية

بنفس الطريقة نجد : (w_n) تناقصية

ب- بين أن : $v_n \leq w_n$ ($\forall n \in \mathbb{N}$)

بالترجع :

لدينا : $v_0 \leq w_0$

نفترض أن : $v_n \leq w_n$

إذن : $f \circ f (v_n) \leq f \circ f (w_n)$

ومنه : $v_{n+1} \leq w_{n+1}$

ج - لنبين أن : $1 \leq u_n \leq \frac{3}{2}$ ($\forall n \in \mathbb{N}$)

بالترجع :

لدينا : $1 \leq u_0 \leq \frac{3}{2}$

نفترض أن : $1 \leq u_n \leq \frac{3}{2}$

بما أن : f تناقصية على $\mathbb{R} - \{-1\}$ و $u_n \in \mathbb{R} - \{-1\}$

فإن : $f(1) \geq f(u_n) \geq f\left(\frac{3}{2}\right)$

ومنه : $\frac{3}{2} \geq u_{n+1} \geq \frac{7}{5}$

إذن : $1 \leq u_{n+1} \leq \frac{3}{2}$

د - بين أن : $|u_{n+1} - u_n| \leq \frac{1}{n}$ ($\forall n \in \mathbb{N}^*$)

بالترجع :

لدينا : $|u_2 - u_1| = \frac{1}{10}$ ؛ $\frac{1}{10} \leq \left(\frac{1}{4}\right)^1$

إذن : $|u_2 - u_1| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^1$

نفترض أن : $|u_{n+1} - u_n| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$

$$|u_{n+2} - u_{n+1}| = \frac{|u_{n+1} - u_n|}{|1+u_n||1+u_{n+1}|}$$

$$\frac{2}{5} \leq \frac{1}{1+u_n} \leq \frac{1}{2} ; \frac{2}{5} \leq \frac{1}{1+u_{n+1}} \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{إذن : } \frac{|u_{n+1} - u_n|}{|1+u_n||1+u_{n+1}|} \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$$

$$\text{إذن : } \frac{|u_{n+1} - u_n|}{|1+u_n||1+u_{n+1}|} \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}$$

$$\text{ومنه : } |u_{n+2} - u_{n+1}| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}$$

هـ - لنبين أن : (v_n) و (w_n) متحاديان ثم نحدد نهايتهما

$$\text{من لدينا : } |u_{n+1} - u_n| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n \quad (\forall n \in \mathbb{N}^*)$$

$$\text{إذن : } |u_{2n+1} - u_{2n}| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{2n} \quad (\forall n \in \mathbb{N}^*)$$

$$\text{ومنه : } |v_n - w_n| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{2n} \quad (\forall n \in \mathbb{N}^*)$$

$$\text{إذن : } \lim(v_n - w_n) = 0$$

ولدينا : (w_n) تناقصية و (v_n) تزايدية

إذن : (v_n) و (w_n) متحاديان

$$\text{نعتبر : } \lim v_n = \lim w_n = l$$

$$\text{بما أن : } 1 \leq u_n \leq \frac{3}{2}$$

$$\text{فإن : } 1 \leq v_n \leq \frac{3}{2} ; 1 \leq w_n \leq \frac{3}{2}$$

$$\text{إذن : } 1 \leq l \leq \frac{3}{2}$$

$$\text{لدينا : } w_n = f(v_n)$$

$$\text{و } f \text{ متصلة في } l \text{ و } \lim v_n = l$$

$$\text{إذن : } \lim w_n = f(\lim v_n)$$

$$\text{ومنه : } l = f(l)$$

$$\text{نجد : } l = -\sqrt{2} ; l = \sqrt{2}$$

$$\text{بما أن : } 1 \leq l \leq \frac{3}{2}$$

$$l = \sqrt{2}$$

فإن :

$$\text{إذن : } \lim v_n = \lim w_n = \sqrt{2}$$

و - استنتج أن : (u_n) متقاربة ثم حدد نهايتها

من التمرين 7-2-د -

$$\lim v_n = \lim w_n = l \Leftrightarrow \lim u_n = l \quad (l \in \mathbb{R})$$

$$\lim u_n = \sqrt{2} \quad \text{إذن :}$$

تمرين 9

$$k \in \mathbb{R}; k \geq 1$$

$$\text{نعتبر : } u_0 = k, \quad u_{n+1} = k + \frac{1}{u_n}, \quad n \in \mathbb{N}$$

$$v_n = u_{2n} \quad ; \quad w_n = u_{2n+1}$$

$$\text{أ- بين أن : } (\forall n \in \mathbb{N}) \quad k \leq u_n < k+1$$

$$\text{ب- بين أن : } (\forall n \in \mathbb{N}) \quad v_n \leq w_n$$

$$\text{ج- بين أن : } (v_n) \quad \text{و} \quad (w_n) \quad \text{متحاديتان}$$

ثم حدد نهايتهما α

$$\text{د- بين أن : } (\forall n \in \mathbb{N}) \quad |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{\alpha k}\right)^n |k - \alpha|$$

$$\text{ه- بين أن : } \lim u_n = \alpha$$

الحل

$$\text{نعتبر : } (D_f = \mathbb{R}^*) \quad f(x) = k + \frac{1}{x}$$

$$f'(x) = \frac{-1}{x^2}$$

f تناقصية

$$u_0 = k; u_1 = \frac{k^2+1}{k}; u_2 = \frac{k^3+2k}{k^2+1}; u_3 = \frac{k^4+3k^2+1}{k^3+2k}$$

$$\text{أ- لنبين أن : } (\forall n \in \mathbb{N}) \quad k \leq u_n \leq k+1$$

بالترجع :

$$\text{لدينا : } k \leq u_0 \leq k+1$$

$$\text{نفترض أن : } k \leq u_n \leq k+1$$

$$\text{بما أن : } f \text{ تناقصية على } \mathbb{R}^* \text{ و } [k; k+1] \subset \mathbb{R}^*$$

$$\text{فإن : } f(k) \geq f(u_n) \geq f(k+1)$$

$$\text{ومنه : } k+1 \geq \frac{k^2+1}{k} \geq u_{n+1} \geq \frac{k^3+2k}{k^2+1} \geq k$$

$$\text{إذن : } k \leq u_{n+1} \leq k+1$$

$$\text{ب- لنبين أن : } (\forall n \in \mathbb{N}) \quad v_n \leq w_n$$

بالترجع :

$$\text{لدينا : } v_0 \leq w_0$$

$$\text{نفترض أن : } v_n \leq w_n$$

$$\text{إذن : } f \circ f(v_n) \leq f \circ f(w_n)$$

$$\text{ومنه : } v_{n+1} \leq w_{n+1}$$

$$\text{ج- رتبة : } (v_n) \quad ; \quad (w_n)$$

$$v_0 \leq v_1$$

بالترجع نبين أن : (v_n) تزايدية

لدينا : $v_0 \leq v_1$

نفترض أن : $v_n \leq v_{n+1}$

بما أن : f تناقصية على \mathbb{R}^* فإن : $f \circ f$ تزايدية على \mathbb{R}^* و

$$u_n \in \mathbb{R}^*$$

فإن : $f \circ f(v_n) \leq f \circ f(v_{n+1})$ إذن : $v_{n+1} \leq v_{n+2}$

إذن : (v_n) تزايدية

بنفس الطريقة نجد : (w_n) تناقصية

$$\text{- لنبين أن : } (\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad |u_{n+1} - u_n| \leq \left(\frac{1}{k}\right)^n$$

بالترجع :

$$\text{لدينا : } |u_2 - u_1| = \frac{1}{k}$$

$$\text{إذن : } |u_2 - u_1| \leq \left(\frac{1}{k}\right)^1$$

$$\text{نفترض أن : } |u_{n+1} - u_n| \leq \left(\frac{1}{k}\right)^n$$

$$|u_{n+2} - u_{n+1}| = \frac{|u_{n+1} - u_n|}{|u_n| |u_{n+1}|}$$

$$\frac{1}{k+1} \leq \frac{1}{1+u_n} \leq \frac{1}{k} ; \quad \frac{1}{k+1} \leq \frac{1}{1+u_{n+1}} \leq \frac{1}{k}$$

$$\text{إذن : } \frac{|u_{n+1} - u_n|}{|u_n| |u_{n+1}|} \leq \left(\frac{1}{k}\right)^n \times \frac{1}{k} \times \frac{1}{k}$$

$$\text{إذن : } \frac{|u_{n+1} - u_n|}{|u_n| |u_{n+1}|} \leq \left(\frac{1}{k}\right)^{n+1}$$

$$\text{ومنه : } |u_{n+2} - u_{n+1}| \leq \left(\frac{1}{k}\right)^{n+1}$$

- لنبين أن : (v_n) و (w_n) متحاديتان ثم نحدد نهايتهما

$$\text{من لدينا : } (\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad |u_{n+1} - u_n| \leq \left(\frac{1}{k}\right)^n$$

$$\text{إذن : } (\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad |u_{2n+1} - u_{2n}| \leq \left(\frac{1}{k}\right)^{2n}$$

$$\text{ومنه : } (\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad |v_n - w_n| \leq \left(\frac{1}{k}\right)^{2n}$$

بما أن : $(k > 1)$

$$\text{فإن : } \lim(v_n - w_n) = 0$$

ولدينا : (w_n) تناقصية و (v_n) تزايدية

إذن : (v_n) و (w_n) متحاديتان

$$\text{نعتبر : } \lim v_n = \lim w_n = l$$

بما أن : $k \leq u_n \leq k+1$

$$v_n = u_n + \frac{1}{nn!} \text{ و } n \geq 1 \quad u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \quad \text{-3}$$

تمرين 11

$$n \in \mathbb{N} \quad , \quad u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{\sqrt{u_n^2 + 1}} - 1 \quad , \quad u_0 = -\frac{1}{2}$$

أ- بين أن : $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad -1 < u_n < 0$

ب- بين أن : (u_n) تناقصية

ج- بين أن : (u_n) متقاربة ثم حدد نهايتها

الحل

$$(D_f = \mathbb{R}^*) \quad f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}} - 1 \quad \text{نعتبر :}$$

$$f'(x) = \frac{-1}{x^2}$$

f تزايدية على $]-\infty; 1]$

أ- لنبين أن : $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad -1 < u_n < 0$

$$\text{بالترجع : } -1 < u_0 = -\frac{1}{2} < 0$$

نفترض أن : $-1 < u_n < 0$

بما أن : f تزايدية على $]-\infty; 1]$ و $]-1; 0[\subset]-\infty; 1]$

$$\text{فإن : } f(-1) < f(u_n) < f(0)$$

$$\text{ومنه : } -1 < u_{n+1} < 0$$

ب- لنبين أن : (u_n) تناقصية

بالترجع :

$$\text{لدينا : } u_0 = -\frac{1}{2} ; u_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} - 1$$

$$\text{إن : } u_1 \leq u_0$$

نفترض أن : $u_{n+1} \leq u_n$

$$\text{إن : } f(u_{n+1}) \leq f(u_n)$$

$$\text{ومنه : } u_{n+2} \leq u_{n+1}$$

ج- لنبين أن : (u_n) متقاربة ثم نحدد نهايتها

بما أن : (u_n) تناقصية مغورة فإن (u_n) متقاربة

$$\text{نعتبر : } \lim u_n = l$$

$$\text{بما أن : } -1 < u_n < 0$$

$$\text{فإن : } -1 < l < 0$$

لدينا : $f(u_n) = u_{n+1}$ و f متصلة على $[-1; 0]$

$$\text{و } f([-1; 0]) \subset [-1; 0]$$

إن :

$$f(l) = l$$

$$\text{نجد : } l = -1 ; l = 0$$

فإن : $k \leq v_n \leq k+1 ; k \leq w_n \leq k+1$

إن : $k \leq l \leq k+1$

لدينا : $w_n = f(v_n)$

و f متصلة في l و $\lim v_n = l$

إن : $\lim w_n = f(\lim v_n)$

ومنه : $l = f(l)$

$$\text{نجد : } l = \frac{k - \sqrt{k^2 + 4}}{2} ; l = \frac{k + \sqrt{k^2 + 4}}{2}$$

بما أن : $k \leq l \leq k+1$

$$\text{فإن : } l = \frac{k + \sqrt{k^2 + 4}}{2}$$

$$\text{إن : } \lim v_n = \lim w_n = \frac{k + \sqrt{k^2 + 4}}{2}$$

د- بين أن : $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{\alpha k}\right)^n |k - \alpha|$

بالترجع :

$$|u_0 - \alpha| = |k - \alpha| \leq \left(\frac{1}{\alpha k}\right)^0 |k - \alpha|$$

$$\text{نفترض أن : } |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{\alpha k}\right)^n |k - \alpha|$$

لدينا : $\alpha = f(\alpha)$

$$|u_{n+1} - \alpha| = \left|k + \frac{1}{u_n} - \left(k + \frac{1}{\alpha}\right)\right| = \left|\frac{1}{u_n} - \frac{1}{\alpha}\right| = \left|\frac{u_n - \alpha}{u_n \alpha}\right|$$

$$|u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{\alpha k}\right)^n \frac{1}{u_n \alpha} |k - \alpha|$$

$$\text{إن : } |u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{\alpha k}\right)^{n+1} |k - \alpha|$$

ه- استنتاج أن : (u_n) متقاربة ثم تحديد نهايتها

$$1 < k \leq \alpha \leq k+1$$

ومنه : $\alpha k > 1$

$$\text{إن : } \lim |u_n - \alpha| \leq \lim \left(\left(\frac{1}{\alpha k}\right)^n |k - \alpha|\right)$$

$$\text{إن : } \lim |u_n - \alpha| \leq 0$$

ومنه : $\lim u_n = \alpha$

تمرين 10

بين أن : (u_n) و (v_n) متحاديان

$$v_n = u_n + \frac{1}{n} \text{ و } n \geq 1 \quad u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3} \quad \text{-1}$$

$$v_n = u_n + \frac{1}{3n^2} \text{ و } n \geq 2 \quad u_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2(k+1)^2} \quad \text{-2}$$

$$-4 \text{ بين أن : } \forall n \in \mathbb{N}^* - \{1\} \left(\frac{3}{2}\right)^n \geq n$$

$$-5 \text{ حدد : } \lim \frac{n}{2^n} \text{ ثم استنتج : } \lim u_n$$

الحل

1- لنبين أن (w_n) هندسية

$$\begin{aligned} w_{n+1} &= u_{n+2} - \frac{1}{2}u_{n+1} \\ &= u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n - \frac{1}{2}u_{n+1} \\ &= \frac{1}{2} \left(u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n \right) \end{aligned}$$

$$w_{n+1} = \frac{1}{2}w_n$$

$$w_0 = \frac{3}{2}$$

(w_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ حدها الأول $\frac{3}{2}$

$$w_n = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

2- لنبين أن (v_n) حسابية

$$\begin{aligned} v_{n+2} &= 2^{n+2}u_{n+2} \\ &= 2^{n+2} \left(u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n \right) \\ &= 2 \times 2^{n+1}u_{n+1} - 2^n u_n \\ &= 2v_{n+1} - v_n \end{aligned}$$

$$\text{إذن : } v_{n+2} - v_{n+1} = v_{n+1} - v_n = \dots = v_1 - v_0 = 2 + 1 = 3$$

(v_n) حسابية أساسها 3 حدها الأول -1

$$v_n = -1 + 3n$$

3- حساب u_n بدلالة n

$$u_n = \frac{-1 + 3n}{2^n}$$

$$-4 \text{ لنبين أن : } \forall n \in \mathbb{N}^* - \{1\} \left(\frac{3}{2}\right)^n \geq n$$

بالترجع :

$$-5 \text{ تحديد : } \lim \frac{n}{2^n} \text{ ثم استنتج : } \lim u_n$$

$$\frac{n}{2^n} \leq \frac{1}{2^n} \times \left(\frac{3}{2}\right)^n = \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

$$\text{إذن : } \lim \frac{n}{2^n} = 0$$

$$\lim u_n = \lim \frac{-1 + 3n}{2^n} = \lim \frac{-1}{2^n} + \lim \frac{3n}{2^n} = 0 + 0$$

$$\text{بما أن : } (u_n) \text{ تناقصية فإن : } u_n < u_0 = -\frac{1}{2}$$

$$\text{إذن : } l \leq -\frac{1}{2} \text{ ومنه : } l = -1$$

$$\text{إذن : } \lim u_n = -1$$

تمرين 12

$$n \in \mathbb{N} \text{ ، } u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n} \text{ ، } u_0 = 1$$

1- ادرس رتبة

2- بين أن غير مكبورة استعمل برهانا بالخلف

3- استنتج

الحل

1- (u_n) تزايدية

2- نفترض أن (u_n) مكبورة

إذن (u_n) متقاربة

نعتبر : $\lim u_n = l$ (1)

نعتبر : $f(x) = x + \frac{1}{x}$ ($D_f = \mathbb{R}^*$)

f متصلة على : $[1; +\infty[$ (2)

$$f'(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2}$$

f تزايدية على : $[1; +\infty[$

$$u_n \geq u_0 \geq 1 \text{ لأن } u_n \in [1; +\infty[$$

$$f([1; +\infty[) = [2; +\infty[$$

إذن : $f([1; +\infty[) \subset [1; +\infty[$ (3)

ولدينا : $f(u_n) = u_{n+1}$ (4)

من : (1) ; (2) ; (3) ; (4) : $f(l) = l$

$$\frac{1}{l} \neq 0 \text{ تناقض مع } f(l) = l \Leftrightarrow 0 = \frac{1}{l}$$

إذن (u_n) غير مكبورة

3- بما أن (u_n) تزايدية غير مكبورة

فإن : $\lim u_n = +\infty$

تمرين 13

نعتبر :

$$n \in \mathbb{N} \text{ ، } u_{n+2} = u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n \text{ ، } u_1 = 1 \text{ ، } u_0 = -1$$

$$w_n = u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n \text{ ؛ } v_n = 2^n u_n$$

1- بين أن (w_n) هندسية ثم احسب w_n بدلالة n

2- بين أن (v_n) حسابية ثم احسب v_n بدلالة n

3- احسب u_n بدلالة n

$(u_n)_{n \geq 1}$ est convergente

2- montrons que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) u_n = \frac{\sin(\alpha)}{2^n \sin\left(\frac{\alpha}{2^n}\right)}$

Par récurrence :

montrons que : $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sin(\alpha)}{2 \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}$

On sait que : $\sin(\alpha) = 2 \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$

Donc : $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sin(\alpha)}{2 \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}$

Supposons que : $u_n = \frac{\sin(\alpha)}{2^n \sin\left(\frac{\alpha}{2^n}\right)}$

$$u_{n+1} = u_n \cos\left(\frac{\alpha}{2^{n+1}}\right) = \frac{\sin(\alpha)}{2^n \sin\left(\frac{\alpha}{2^n}\right)} \cos\left(\frac{\alpha}{2^{n+1}}\right)$$

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2^n}\right) = 2 \cos\left(\frac{\alpha}{2^{n+1}}\right) \sin\left(\frac{\alpha}{2^{n+1}}\right)$$

Donc : $u_{n+1} = \frac{\sin(\alpha)}{2^{n+1} \sin\left(\frac{\alpha}{2^{n+1}}\right)}$

On sait que : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{\frac{1}{\frac{1}{x}}}$

$$\lim 2^n \sin\left(\frac{\alpha}{2^n}\right) = \alpha \lim \frac{\sin\left(\frac{\alpha}{2^n}\right)}{\frac{\alpha}{2^n}} = \alpha$$

Donc : $\lim u_n = \frac{\sin(\alpha)}{\alpha}$

$$\lim u_n = 0$$

تمرين 14

نعتبر الدالة العددية $x \in \mathbb{R} - \{-1\}$ $f(x) = \frac{2x+1}{x+1}$

$$n \in \mathbb{N} \quad , \quad u_{n+1} = f(u_n) \quad , \quad u_0 = 1$$

$$n \in \mathbb{N} \quad , \quad v_{n+1} = f(v_n) \quad , \quad v_0 = 2$$

$$I = [1; 2]$$

1- بين أن : $f(I) \subset I$

2- بين أن : $(v_n) \subset I$; $(u_n) \subset I$

3- بين أن : (u_n) : تزايدية و أن (u_n) تناقصية

4- بين أن : $(\forall n \in \mathbb{N}) |v_n - u_n| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$

5- بين أن : (v_n) و (w_n) متحاديتان ثم حدد نهايتهما

الحل

5- لنبين أن : $(\forall n \in \mathbb{N}) |v_n - u_n| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$

بالترجع :

$$|v_{n+1} - u_{n+1}| \leq \frac{|v_n - u_n|}{|u_{n+1} + 1| |v_{n+1} + 1|} \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}$$

Exercice 15 $\alpha \in]0; \pi[$

soit $(u_n)_{n \geq 1}$ la suite définie par :

$$u_n = \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{\alpha}{2^k}\right)$$

1- montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est décroissante et minorée et déduire qu'elle est convergente

2- montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) u_n = \frac{\sin(\alpha)}{2^n \sin\left(\frac{\alpha}{2^n}\right)}$ et

en déduire la limite de la suite $(u_n)_{n \geq 1}$

Solution

On a $\alpha \in]0; \pi[$ et $n \geq 1$ donc $\frac{\alpha}{2^n} \in]0; \frac{\pi}{2}[$

Alors : $0 < \cos(\alpha) < 1$ et $0 < \cos\left(\frac{\alpha}{2^k}\right) < 1$

Donc : $0 < u_n < 1$

$u_{n+1} = u_n \cos\left(\frac{\alpha}{2^{n+1}}\right)$; puisque : $0 < \cos\left(\frac{\alpha}{2^{n+1}}\right) < 1$

On a : $u_{n+1} \leq u_n$

Donc : $(u_n)_{n \geq 1}$ est décroissante

Et puisque : $(u_n)_{n \geq 1}$ minorée par 0