

تمرين 1

9pnt

لتكن f الدالة العددية المعرفة على \mathbb{R} بما يلي :
و ليكن (C_f) منحنها
في معلم متعامد ممنظم (\vec{i}, \vec{j}) مع $\|\vec{i}\| = 1$.

الجزء 1

١) احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

ب) ادرس الفروع اللانهائية للمنحنى (C_f) .

٢) ادرس تغيرات الدالة f على \mathbb{R} .

٣) ادرس تغير المنحنى (C_f) .

ب) انشئ المنحنى (C_f) .

٤) أ) بين أن f حل للمعادلة التفاضلية $y'' + 3y' + 2y = -e^{-2x}$

ب) حدد الحل العام للمعادلة التفاضلية (E) .

الجزء 2

ليكن n عددا صحيحا طبيعيا غير منعدم و لتكن A_n مساحة الحيز المحصور بين المنحنى (C_f)
و محور الأفاصيل و محمور الأراتيب و المستقيم ذو المعادلة $x = n$

١) احسب A_n بدلالة n .

٢) احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n$

الجزء 3

لكل عدد صحيح طبيعي غير منعدم n نضع :

١) بين أن : $u_n = \int_0^n \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n e^{-2t} dt$

٢) أ) بين أن $2 - u \leq \frac{1}{u} \leq 1$

ب) استنتج أن $x - \frac{x^2}{2n} \leq n \ln(1 + \frac{x}{n}) \leq x$

٣) أ) بين أن : $u_n \leq \int_0^n e^{-x} dx$

ب) بين أن : $e^{-\frac{1}{2\sqrt[3]{n}}} \int_0^{\sqrt[3]{n}} e^{-x} dx \leq u_n$

ج) استنتاج أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ متقاربة و حدد نهايتها.

٤) ليكن a من المجال $[0, 1]$.

أ) بين أن : $\int_a^1 n(f(x))^n dx \leq n(1 - a)(f(a))^n$

ب) استنتاج أن $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^1 n(f(x))^n dx = 0$

ج) احسب : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^a n(f(x))^n dx$

تمرين 2	3pnt
نعتبر في \mathbb{C} المعادلة التالية :	0, 25
$(E) : z^3 - \frac{3}{2}(\sqrt{3} + i)z - (1 + i) = 0$	
و نعتبر العدد العقدي $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$	0, 25
➊ تحقق من أن الجذور المكعبة للعدد 1 هي 1 و j و \bar{j} .	0, 25
➋ حدد عددين عقديين x و y يتحققان النظمة :	0, 25
➌ ليكن α و β عددين عقديين بحيث $\alpha + \beta$ حل للمعادلة (E) و $\alpha\beta = -ij$	0, 25
أ) بين أن α^3 و β^3 يتحققان النظمة (S) .	0, 5
ب) استنتج أن حلول المعادلة (E) تكتب على الشكل $iz - 1$ و $j(1 - ij) - 1$ و $(i - \bar{j})(1 - i\bar{j}) - 1$.	0, 75
➍ أ) ليكن θ عنصراً من المجال $[0, 2\pi]$.	0, 5
حدد بدلالة θ معيار و عمدة العدد العقدي $.1 - (\cos \theta + i \sin \theta)$.	0, 75
ب) حدد معيار و عمدة كل حل من حلول المعادلة (E) .	0, 75
تمرين 3	3pnt
نعتبر في \mathbb{C} المستوي العقدي منسوب إلى معلم متعمد ممنظم (O, \vec{u}, \vec{v})	0, 75
نعتبر في \mathbb{C} المعادلة التالية :	0, 75
$(E_\theta) : z^2 - 2z + \frac{1}{\cos^2(\theta)} = 0$	
حيث θ بارمترى حقيقي ينتمي إلى المجال $.\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$	0, 75
➊ أ) حل في \mathbb{C} المعادلة (E_θ) .	0, 75
ب) ليكن z_1 و z_2 حلـيـاً المعادلة (E_θ) حيث $Im(z_1) = \tan \theta$	0, 75
اكتـبـ z_1 و z_2 على الشـكـلـ المـثـلـثـيـ.	0, 75
➋ لـتـكـنـ M_1 و M_2 عـلـىـ التـوـالـيـ صـورـتـيـ z_1 و z_2 فـيـ المـسـتـوـيـ العـقـدـيـ. بـيـنـ أـنـ المـثـلـثـ OM_1M_2 مـتسـاوـيـ السـاقـيـنـ فـيـ O .	0, 75
➌ ليـكـنـ n مـنـ \mathbb{N} . نـعـتـبـرـ فـيـ \mathbb{C} المـعـادـلـةـ التـالـيـةـ :	0, 75
$(E) : z^{2n} - 2z^n + \frac{1}{\cos^2(\theta)} = 0$	
حدد حلـولـ المـعـادـلـةـ (E) عـلـىـ الشـكـلـ المـثـلـثـيـ.	0, 75

تمرين 4

2pnt

$\text{pgcd}(p, q) = 1$ حيث a و b و p و q أعداد صحيحة و $x \equiv a[p]$ و $x \equiv b[q]$ نعتبر في \mathbb{Z}^2 النظمة

❶ بين أنه يوجد زوج (u_0, v_0) من \mathbb{Z}^2 بحيث $pu_0 + qv_0 = 1$ 0,25

ب) بين أن $x_0 = bpu_0 + aqv_0$ حل للنظمة (S) 0,5

❷ ليكن x حل للنظمة (S) بين أن x_0 يقسم العدد 0,25

❸ ليكن x عدداً صحيحاً نسبياً بحيث pq يقسم العدد $x - x_0$. بين أن x حل للنظمة (S) 0,5

❹ استنتج مجموعة حلول النظمة (S) 0,25

(S') $\begin{cases} x \equiv 1[8] \\ x \equiv 3[13] \end{cases}$ ❺ استنتاج في \mathbb{Z} حلول النظمة التالية : 0,25

تمرين 5

(3pnt)

Partie 1

❶ a) Prouver que 29 est un nombre premier. (0,25p)

b) Soit $x \in \mathbb{N}$ et n un entier naturel tel que $n \equiv 1[28]$. Prouver que $x^n \equiv x[29]$. (0,25p)

❷ On considère l'équation (E) : $17x - 28y = 1$ où $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$.

a) En utilisant l'algorithme d'Euclide, trouver un tel couple solution. (0,5p)

b) Résoudre dans \mathbb{Z}^2 l'équation (E). (0,5p)

Partie 2

Soit $A = \{x \in \mathbb{N}, x < 29\}$ Pour $x \in A$, on note $f(x)$ le reste de la division euclidienne de x^{17} par 29 et $g(x)$ le reste de la division euclidienne de x^5 par 29.

❸ a) Prouver que $f(x) \in A$ et $x^{17} \equiv f(x)[29]$, puis Prouver que $g(x) \in A$ et $x^5 \equiv g(x)[29]$. (0,25p)

b) Pour $x \in A$, prouver que $g(f(x)) = x$. (0,25p)

❹ Applications :

On attribue à chaque lettre de l'alphabet et "α" et "β", l'entier donné par le tableau ci-dessous :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	α	β
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

a) Bob code le mot "BENSOUDA" à l'aide de la fonction f et envoie le message codé à Alice. Voici le codage des cinq premières lettres "B", "E", "N", "S" et "O" :

Message initial	B	E	N	S	O
Entier associé	2	5	14	19	15
Utilisation de f	$2^{17} \equiv 21[29]$	$5^{17} \equiv 9[29]$	$14^{17} \equiv 11[29]$	$19^{17} \equiv 14[29]$	$15^{17} \equiv 18[29]$
Entier associé	21	9	11	14	18
Message codé	U	I	K	N	R

Compléter son message.(0,5p)

b) Alice reçoit le message suivant, codé par Bob, à l'aide de la fonction f :

B	J	A	C	I	Z
---	---	---	---	---	---

Décrypter ce message à la place d'Alice. (0,5p)



Scanner le cod QR pour avoir la correction