

## الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة الاستعدادية 2022

- الموضوع -

المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية

والتعليم الأول والثالث

المركز الوطني للتقويم والامتحانات



المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية

والتعليم الأول والثالث

المركز الوطني للتقويم والامتحانات

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

RS 36

2	مدة الإجابة	علوم الحياة والأرض	المادة
3	المعامل	شعبة العلوم الرياضية: مسلك العلوم الرياضية أ	الشعبة أو المسلك

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة

المكوّن الأول: استرداد المعارف (5 نقط)

I. عرف (ي) في ورقة تحريرك ما يلي: الساكنة - المحتوى الجيني. (1 ن)

II. يوجد اقتراح صحيح بالنسبة لكل معطى من المعطيات المرقمة من 1 إلى 4.  
 أنقل (ي) الأزواج الآتية على ورقة تحريرك ثم اكتب (ي) داخل كل زوج الحرف المقابل للاقتراح الصحيح. (2 ن)

(1، ...) (2، ...) (3، ...) (4، ...)

1- تتميز الساكنة النظرية المثالية لنوع ثنائي الصيغة الصبغية بـ: أ. تزاوجات عشوائية بين أفراد ذوو عدد محدود؛ ب. تزاوجات موجهة بين أفراد ذوو عدد لا مُنْتَه؛ ج. غياب التدفقات المرتبطة بالهجرة؛ د. تغير في ترددات الحليلات من جيل لآخر.	2- خلال الانحراف الجيني، ومع مرور الزمن، يصبح المحتوى الوراثي للساكنة: أ. أقل تنوعا مما يؤدي إلى انخفاض التغير الوراثي؛ ب. أكثر تنوعا مما يؤدي إلى ارتفاع التغير الوراثي؛ ج. أقل تنوعا مما يؤدي إلى ارتفاع التغير الوراثي؛ د. أكثر تنوعا مما يؤدي إلى انخفاض التغير الوراثي.
3- تؤدي الهجرة الأحادية الاتجاه وفق نموذج الجزيرة والقارة إلى: أ. تغير البنية الوراثية للساكنة الكبيرة (ساكنة القارة)؛ ب. تغير البنية الوراثية للساكنة الصغيرة (ساكنة الجزيرة)؛ ج. تجانس تردد الحليلات بين الساكنتين؛ د. ثبات في البنية الوراثية للساكنتين.	4- المفعول المؤسس ظاهرة من ظواهر: أ. عامل الهجرة حيث يتم تأسيس ساكنة جديدة انطلاقا من مجموعة مهاجرة صغيرة؛ ب. عامل الهجرة حيث يتم تأسيس ساكنة جديدة انطلاقا من مجموعة مهاجرة كبيرة؛ ج. الانحراف الجيني حيث يتم تأسيس ساكنة جديدة انطلاقا من مجموعة مهاجرة صغيرة؛ د. الانحراف الجيني حيث يتم تأسيس ساكنة جديدة انطلاقا من مجموعة مهاجرة كبيرة.

III- أنقل (ي) على ورقة تحريرك الحرف المقابل لكل اقتراح ثم اكتب (ي) أمامه "صحيح" أو "خطأ". (2 ن)

أ. حسب قانون Hardy-Weinberg يكون تردد المظاهر الخارجية، عند الذكور، مساويا لتردد الأنماط الوراثية في حالة المورثة المرتبطة بالصبغي الجنسي X.

ب. حسب قانون Hardy-Weinberg وفي حالة تساوي السيادة، يساوي تردد المظاهر الخارجية تردد الأنماط الوراثية.

ج. خلال التغير الوراثي للساكنة، ليست للطفرة الوراثية أي علاقة بالانتقاء الطبيعي.


د. تتكون الساكنة من جميع الأفراد القادرين على التوالد فيما بينهم مع إعطاء خلف خصيب.

المكوّن الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني (15 نقطة)

التمرين الأول: (6.75 نقطة)

قصد إبراز دور الانقسام الاختزالي والإخصاب في ثبات عدد الصبغيات (الصيغة الصبغية) وفي تنوع المظاهر الخارجية عند نبات الزنبق (نبات زهري) نقترح المعطيات الآتية:

I. يتجلى التوالد الجنسي عند نبات الزنبق في التقاء حبة لقاح (النبات المشيجي الذكري) مع الكيس الجنيني (النبات المشيجي الأنثوي). بعد الإخصاب يعطي الكيس الجنيني البذرة ويتحول المبيض إلى ثمرة. عند توفر الظروف الملائمة تنبت البذرة لتعطي نبتة قتيبة جديدة. تمثل الوثيقة الآتية دورة نمو هذا النبات.



1. باستغلال المعطيات السابقة وعلما أن نبات الزنبق يتوفر على 24 صبغى، أعط (ي) الصيغة الصبغية لكل من النبتة والكيس الجنيني. (0.5 ن)

2. تتميز دورة نمو نبات الزنبق بتعاقب مرحلتين: مرحلة النبات البوغي ومرحلة النبات المشيجي. استخرج (ي)، معللا (معللة) إجابتك، من هذه الدورة كل مرحلة من هاتين المرحلتين: (0.5 ن)

3. أنجز (ي) الدورة الصبغية لهذا النبات ثم استنتج (ي) نمطها. (0.75 ن)

II. لمعرفة كيفية انتقال صفتين وراثيتين عند نبات الزنبق، نجز التزاوجين الآتيين :

- التزاوج الأول: بين نبات بزهور حمراء وبتلات كاملة ونبات بزهور صفراء وبتلات مقطّعة. أعطت البذور الناتجة عن هذا التزاوج بعد زرعها جيلا  $F_1$  يتكون من نباتات بزهور برتقالية وبتلات مقطّعة.

- التزاوج الثاني: بين نبات الجيل  $F_1$  ونبات بزهور حمراء وبتلات كاملة. أعطى هذا التزاوج جيلا  $F_2$  يتكون من المظاهر الخارجية الآتية:

194 - نبتة بزهور حمراء وبتلات كاملة.	8 - نباتات بزهور حمراء وبتلات مقطّعة.
190 - نبتة بزهور برتقالية وبتلات مقطّعة.	9 - نباتات بزهور برتقالية وبتلات كاملة.

4. انطلاقا من استغلال نتائج التزاوجين الأول والثاني، حدد (ي) كيفية انتقال المورثتين المدروستين. (1 ن)

- بالنسبة لحليلي المورثة المسؤولة عن لون الأزهار استعمل (ي): الرمز  $(R و J)$  في حالة تساوي السيادة أو الرمز  $(R و r)$  في حالة السيادة التامة؛

- بالنسبة لحليلي المورثة المسؤولة عن شكل البتلات استعمل (ي): الرمز  $(D و E)$  في حالة تساوي السيادة أو الرمز  $(D و d)$  في حالة السيادة التامة.

5. أعط (ي) التفسير الصبغى لنتائج التزاوجين الأول والثاني. (2.25 ن)


6. باستعمالك رسوما مناسبة، فسر (ي) الظاهرة المسؤولة عن تنوع أمشاج أفراد الجيل  $F_1$ . (0.75 ن)

يرغب بستاني في الحصول على سلالة جديدة من نبات الزنبق ذات زهور حمراء وبتلات مقطّعة.

7. باعتمادك على الأنماط الوراثية المحصل عليها بالجيل  $F_2$ ، اقترح (ي) التزاوج الذي يُمكن من الحصول على نسبة كبيرة من المظهر الخارجي المرغوب، معللا (معللة) إجابتك بواسطة شبكة التزاوج. (1 ن)

### التمرين الثاني: (3.25 نقط)

ترسب الأصبغة الدموية (L'hémochromatose) مرض وراثي ناجم عن طفرة في المورثة HFE التي ترمز لبروتين مسؤول عن تنظيم امتصاص المعني للحديد. تظهر أعراضه انطلاقاً من سن الثلاثين: عياء عام، مع احتمال تليف الكبد والإصابة بالسكري والسرطان. تمثل الوثيقة 1 شجرة نسب عائلة بعض أفرادها مصابون بهذا بمرض.



الوثيقة 1


1. باعتمادك على شجرة النسب الممثلة بالوثيقة 1، بين (ي):

- أن التحليل المسؤول عن المرض متنح. (0.5 ن)
- أن المورثة المدروسة محمولة على صبغي جنسي أو أنها محمولة على صبغي لا جنسي. (0.75 ن)

2. أعط (ي)، معللاً (معللة) إجابتك، النمط الوراثي لكل من الفردين  $II_2$  و  $II_1$ . (0.5 ن)  
استعمل (ي) الرمز  $H$  أو  $h$  للتحليل المسؤول عن المظهر الخارجي العادي، والرمز  $M$  أو  $m$  للتحليل المسؤول عن الإصابة بالمرض.

3. حدد (ي) بواسطة شبكة التزاوج، احتمال إصابة الفرد  $III_2$  بمرض ترسب الأصبغة الدموية. (1 ن)

يُمكن تحليل جزيئة ADN عن طريق تقنية الهجرة الكهربائية من تحديد تحليلي المورثة المدروسة وبالتالي تحديد النمط الوراثي للفرد المُختَبَر. تمثل الوثيقة 2 النتائج المحصل عليها.



الوثيقة 2


4. باعتمادك على نتائج تحليل ADN، استنتج (ي) النمط الوراثي للفرد  $III_2$ . علل (ي) إجابتك. (0.5 ن)

### التمرين الثالث: (5 نقط)

يتوفر نبات التبغ المستعمل في التزيين والذي يشبه نبات التبغ المستعمل في صناعة السجائر، على أزهار أنبوبية تنبعث منها رائحة عطرة، خصوصاً خلال المساء، كما يتميز هذا النبات بتأوجات يتراوح طولها ما بين 3 و 10cm.

قصد دراسة تغير طول التؤج عند ساكنة نبات التبغ الذي يستعمل في التزيين، نقترح التزاوجين الآتيين:  
- التزاوج الأول: بين سلالتين أوبيتين نقيتين  $P_1$  و  $P_2$ ، أعطى جيلاً  $F_1$ .

- التزاوج الثاني: بين أفراد  $F_1$  ( $F_1 \times F_1$ ). أعطى جيلا  $F_2$ . تمثل الوثيقة الآتية توزيع طول التويج عند السلالتين الأبويتين P1 و P2 (الشكلان 1 و 2) وعند الجيل  $F_2$  (الشكل 3).



الوثيقة

1. قارن (ي) معطيات توزيع طول التويج عند كل من السلالتين الأبويتين P1 و P2. (1 ن)
  2. استنتج (ي) خاصيات توزيع الجيل  $F_2$ . علل (ي) إجابتك. (1 ن)
- قصد القيام بانتقاء آخر لسلالة نقية ذات تويجات طويلة انطلاقا من الجيل  $F_2$ ، تم إنجاز تزاوجات بين الأفراد المنتمين للفئة ذات وسط القسم 89mm فحصلنا على جيل  $F_3$ . يمثل الجدول الآتي النتائج المحصلة.

وسط الأقسام لطول التويج (mm)	99	94	89	84	79	74	69
التردد	9	14	20	20	12	8	4

3. أنجز (ي)، على ورقة تحريرك، مضع الترددات لتوزيع طول التويج. (0.75 ن)
- استعمل (ي) 1cm لكل خمسة أفراد واعتمد (ي) مسافة فاصلة بين أوساط الأقسام تساوي 1cm.
4. أحسب (ي) قيم المعدل الحسابي والانحراف النمطي (المعياري) لهذا التوزيع باعتماد جدول تطبيقي لحساب الثابتات الإحصائية. (1.5 ن)

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n f_i (x_i - \bar{X})^2}{n}} \quad \text{و} \quad \bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n (f_i x_i)}{n}$$

نعطي:

5. هل الانتقاء المنجز انطلاقا من الجيل  $F_2$  أعطى سلالة أكثر تجانسا بالمقارنة مع السلالة الأبوية P2؟ علل (ي) إجابتك. (0.75 ن)

انتهى