



## الرياضيات أولى باك آداب وعلوم إنسانية

### الحصة 1-2 (الحساب العددي والتناسبية – الدرس)

الأستاذ: شدادي هيثم

#### الفهرس

##### I- التناسبية

###### 1-1/ النسبة المئوية

###### 1-2/ التناسب والتناسب العكسي

###### II- المعادلات والمترابجات والنظمات

1-1/ حل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد

1-2/ حل معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد

1-3/ حل نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين

##### I- التناسبية

###### 1-1/ النسبة المئوية

###### تعريف

لتكن  $E$  مجموعة عدد عناصرها  $n$ , و  $A$  جزء من  $E$  عدد عناصره  $m$ .

النسبة المئوية التي تمثلها  $A$  في  $E$  هو العدد  $p$  الذي يتحقق :  $p = \frac{m}{n} \times 100$

ونرمز له بالرمز  $p\%$ .

###### مثال

عدد تلاميذ مؤسسة تعليمية هو 2800 تلميذ وعدد الإناث هو 2100.

$E$  هي مجموعة التلاميذ في المؤسسة، والجزء  $A$  هو مجموعة الفتيات.

النسبة المئوية التي تمثلها الفتیات هي :  $p = \frac{2100}{2800} \times 100 = 75$

يعني : 75%

###### 1-2/ التناسب والتناسب العكسي

###### تعريف 1 (التناسب)

$a$  و  $b$  و  $c$  و  $d$  أعداد غير منعدمة.

يكون  $a$  و  $b$  متناسبين مع  $c$  و  $d$  إذا كان:  $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$

مثال

**تعريف 2 (التناسب العكسي)**


$a$  و  $b$  و  $c$  و  $d$  أعداد غير منعدمة.

يكون  $a$  و  $b$  متناسبين عكسياً مع  $c$  و  $d$  إذا كان:  $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$ , يعني:

مثال

## II- المعادلات والمتراجحات والنظمات

### 1- حل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد



إشارة  $ax + b$  ( $a \neq 0$ )

$x$	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax+b$	عكس إشارة $a$	○	إشارة $a$

### 2- حل معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد

معادلة  $ax^2 + bx + c = 0$  ( $a \neq 0$ ) تسمى معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد.

والعدد  $\Delta = b^2 - 4ac$  يسمى مميزها.

- إذا كان  $\Delta > 0$ , إذن المعادلة تقبل حلين مختلفين هما:

$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$  و  $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ .

- إذا كان  $\Delta = 0$ , إذن المعادلة تقبل حلاً وحيداً هو

$x_0 = \frac{-b}{2a}$ .

- إذا كان  $\Delta < 0$ , إذن المعادلة لا تقبل أي حل في  $\mathbb{R}$ .

مثال

إشارة  $ax^2 + bx + c = 0$  ( $a \neq 0$ )

- إذا كان  $\Delta > 0$ :

$x$	$-\infty$	$x_1$	$\circ$	$x_2$	$+\infty$
$ax^2+bx+c$	$a$ إشارة		عکس إشارة	$a$ إشارة	$a$ إشارة

:  $\Delta = 0$  - إذا كان

$x$	$-\infty$	$x_0$	$+\infty$
$ax^2+bx+c$	$a$ إشارة		$a$ إشارة

:  $\Delta < 0$  - إذا كان

$x$	$-\infty$	$+\infty$
$ax^2+bx+c$		$a$ إشارة

### 3-2 حل نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين

لحل النظمة يمكن استعمال الخوارزمية التالية :

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} \text{ - حسب المحددة :}$$

-2

• إذا كان  $\Delta \neq 0$  :

النظمة تقبل حالاً وحيداً  $(x, y)$  ، حيث  $y = \frac{\Delta y}{\Delta}$  و  $x = \frac{\Delta x}{\Delta}$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix} \text{ و } \Delta x = \begin{vmatrix} c & b \\ c' & b' \end{vmatrix} \text{ علماً أن }$$

• إذا كان  $\Delta = 0$  :

أ- إذا كان  $\Delta \neq 0$  أو  $\Delta y = 0$  ، فإن  $S = \emptyset$

ب- إذا كان  $\Delta = 0$  ، فإن للنظام ما لا نهاية له من الحلول، وتكون هذه الحلول محددة بإحدى المعادلتين.

مثال